Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Nereu Ramos

Serviço de Controle de Infecção - SCIH

Biossegurança - Influenza A (H1N1)

Dra. Ivete I. Masukawa

Infectologista

HNR

PRECAUÇÃO UNIVERSAL OU PRECAUÇÃO PADRÃO

- são um conjunto de medidas utilizadas na assistência à todos os pacientes, quando há manipulação de sangue, secreções e excreções ou contacto com mucosa e pele não íntegra;
- o seu uso independe do diagnóstico presumido ou definido de qualquer doença infecciosa.

PRECAUÇÃO UNIVERSAL OU PADRÃO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs

- luvas, máscara, gorros, óculos de proteção, aventais, botas (lavanderia, limpeza hospitalar, necrópsia)

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

- LAVAGEM DAS MÃOS
- Antissepsia das mãos com álcool a 70%

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

Equipamentos:

- ☞ **Uniforme:** trazer para o trabalho seu uniforme limpo e levá-lo para casa dentro de saco plástico. (Sugerimos lavar separadamente das outras roupas).
- ☞ **Sapato:** fechado e limpo. Poderá ser o mesmo utilizado fora do ambiente hospitalar. Considerar a possibilidade de sapato de uso apenas no local do trabalho se houver condições de guarda adequada. De acordo com a NR 32 do Ministério do Trabalho recomenda-se o uso de sapatos fechados.
 - Obs: lembrar que cada instituição pode instituir uma normativa interna!!

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

- **Máscara de vapores:** utilizar quando houver exposição a produtos químicos passíveis de inalação, por exemplo, na desinfecção de artigos com glutaraldeído, cujo uso é obrigatório.
- **Máscara cirúrgica:** utilizar sempre que houver indicação da enfermagem ou médico em caso de isolamentos
 - Devem ser usadas em procedimentos que possam gerar respingos de sangue ou líquidos, evitando-se assim exposição da membrana mucosa da boca, nariz e olhos.

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

- **Máscara cirúrgica:** utilizada em precaução por **gotículas pelos profissionais da saúde e nos pacientes** na suspeita ou confirmação de doenças transmitidas de forma respiratória (por aerossóis ou gotículas).
 - Recomendamos o uso de máscara cirúrgica nos procedimentos de punção lombar.

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

- As máscaras com filtro (N95, PFF2, etc) são de **uso exclusivo do profissional da saúde** para precaução com **aerossóis**.

- O tempo de uso da máscara com filtro é indeterminado, desde que não haja sujeira, secreções ou umidade podem ser reutilizadas.

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

Luvas:

Luvas de procedimento: devem ser usadas pelos profissionais da saúde e **trocadas após contato com cada paciente** ou entre os diversos procedimentos em um **mesmo paciente**, ao manusear objetos ou superfícies sujas de sangue e/ou líquidos, para punções venosas e outros procedimentos.

- É proibido o uso do mesmo par de luvas em vários pacientes, por exemplo, quando se vai verificar os sinais vitais;
- É proibido a lavagem das luvas;
- È proibido o uso de luvas de procedimento para limpeza hospitalar

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

Luvas de borracha: utilizadas para higienização e limpeza e manipulação de produtos químicos como o glutaraldeído. Possuem as características adequadas sua finalidade: tem cano longo e tem maior resistência a punctura.

- Manter a luva de borracha sempre seca interna e externamente;
- Observar a lavagem das luvas após o uso por dentro e por fora, secar com pano e lembrar de lavar as mãos após a retirada das mesmas.

Equipamentos de Proteção Individual

EPIs

Luvas cirúrgicas ou estéreis:
utilizadas para a realização de
procedimentos que necessitam a
manutenção da esterilidade.

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

- **Aventais:** Utilizar sempre que houver risco de contato com materiais biológicos. O avental na situação de precaução de contato deve ser colocado apenas se houver **contato direto** com o paciente.
 - O avental em situação de precaução de contato, desde que não esteja úmido ou com secreções pode ser reutilizado **no mesmo paciente** (deixá-lo pendurado a beira do leito); trocar a cada plantão.
 - **Avental impermeável:** usar quando estiver lavando os materiais e instrumentais na área suja (Central de Materiais e Esterilização) ou quando o risco de secreções for iminente como por exemplo, no parto e outras cirurgias.
 - Deixá-lo pendurado em suporte específico, após o processo de limpeza e desinfecção.

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

- **Óculos de proteção para os olhos:** Devem ser usados em procedimentos que possam gerar respingos de sangue ou líquidos, evitando-se assim exposição da mucosa dos olhos. Por exemplo, no momento de aspiração de secreções.
- Após o uso lembrar de higienizá-lo para guardar, uma vez que o uso é coletivo. (Lavar com água e sabão; evitar o uso de álcool, pois, danifica o equipamento).
- **Outros EPI(s)** como botas, aventais plásticos deverão ser utilizados de acordo com a situação de risco.

HIGIENIZE AS MÃOS: SALVE VIDAS

Higienização Simples das Mãos

1. Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia.

2. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos (segur a quantidade recomendada pelo fabricante).

3. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.

4. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.

5. Entrelace os dedos e fricçãoe os espaços interdigitais.

6. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem.

7. Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.

8. Fricçãoe as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular.

9. Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.

10. Enxágüe as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.

11. Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

Para a técnica de Higienização Anti-séptica das mãos, seguir os mesmos passos e substituir o sabonete líquido comum por um associado a anti-séptico.

HIGIENIZE AS MÃOS: SALVE VIDAS

Higienização das Mãos com preparações alcoólicas
(Gel ou Solução a 70% com 1-3% de Glicerina)

1. Aplique na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).

2. Friccione as palmas das mãos entre si.

4. Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.

3. Friccione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.

5. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos.

7. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita (e vice-versa), fazendo um movimento circular.

6. Friccione o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.

8. Friccione os punhos com movimentos circulares.

9. Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.

Precaução Padrão

Devem ser seguidas para **TODOS OS PACIENTES**, independente da suspeita ou não de infecções.

Higienização das mãos

Luvas e Avental

Óculos e Máscara

Caixa pérfuro-cortante

- Lave com água e sabonete ou friccione as mãos com álcool 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções.
- Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.
- Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.

Precaução de Contato

Higienização das mãos

Avental

Luvas

Quarto privativo

- Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos, máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; e descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Use luvas e avental em toda manipulação do paciente, de cateteres e de sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do conta-

to com o paciente ou com as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.

Precaução para Gotículas

Higienização das mãos

Máscara Cirúrgica
(profissional)

Máscara Cirúrgica
(paciente durante o
transporte)

Quarto privativo

- Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos, máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; e descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente

- pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Precaução para Aerossóis

Higienização das mãos

Máscara PFF2 (N-95)
(profissional)

Máscara Cirúrgica
(paciente durante o
transporte)

Quarto privativo

- Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos, máscara e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; e descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara PFF2 (N95) antes de entrar no quarto.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo.
- Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Situações especiais

Atendimento de suspeita/confirmação de INFLUENZA A (H1N1)

- **Formas de transmissão:** pessoa a pessoa principalmente por meio da tosse ou espirro e secreções respiratórias de pessoas infectadas. Não há registro de transmissão deste novo subtipo da influenza A para pessoas por meio da ingestão de carne de porco e produtos derivados.
- **Período de incubação:** os sintomas podem iniciar no período de 3 a 7 dias e a transmissão ocorre principalmente em locais fechados.
- O vírus da influenza A não resiste a altas temperaturas (70°C), temperatura em que os alimentos são cozidos ou assados.

Atendimento ambulatorial/porta de entrada

- ✔ Manter o paciente com máscara cirúrgica.
- ✔ Atender com os cuidados de **precaução padrão e por gotículas**,
- ✔ Fazer a desinfecção do estetoscópio e termômetro após cada uso com álcool 70%.
- ✔ Não há necessidade de uso de avental.
- ✔ Usar luvas para examinar o paciente.
- ✔ Usar máscara cirúrgica durante o atendimento.
- ✔ Evitar fazer nebulização (risco de formação de aerossóis).

Atendimento na unidade de internação

Medidas gerais

- Atender com os cuidados de **precaução padrão e por gotículas**.
 - Fazer a desinfecção do estetoscópio e termômetro após cada uso com álcool 70%.
 - Não há necessidade de uso de avental, o mesmo deve ser utilizado de acordo com a possibilidade de contato com secreções ao examinar o paciente (**precaução padrão**).
 - Pode-se reutilizar o avental no mesmo paciente, desde que não esteja sujo ou úmido, deixar pendurado na entrada do quarto.
 - Usar luvas para examinar o paciente
 - Usar máscara cirúrgica durante o atendimento.
- O esfigmomanômetro é de uso coletivo e deve ser friccionado com álcool a 70% se não estiver visivelmente sujo diariamente e se com sujidade, encaminhar para a lavação.

Atendimento na unidade de internação

Cuidados específicos:

- Ao coletar material para pesquisa viral, intubar, fazer broncoscopia (que geram aerossóis) instituir **precaução por aerossóis**:
 - Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente;
 - Usar óculos, máscara, gorro e avental
 - Mantenha a porta do quarto fechada
 - Coloque a máscara com filtro (PFF2, N95).
 - Os EPIs devem ser descartados após estes procedimentos*
- Caso seja feita apenas o swab nasal, não há necessidade de máscara com filtro.
- É contra indicada a realização de nebulizações por gerarem aerossóis (usar broncodilatador em spray).
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros com o mesmo quadro clínico, mantendo a distância entre leitos de 1m ou preferencialmente manter a separação dos leitos por biombos ou cortinas laváveis.

Atendimento na unidade de terapia intensiva

Medidas gerais

- Atender com os cuidados de **precaução padrão e por gotículas.**
- Fazer a desinfecção do estetoscópio e termômetro após cada uso com álcool 70%.
- Não há necessidade de uso de avental, o mesmo deve ser utilizado de acordo com a possibilidade de contato com secreções ao examinar o paciente (**precaução padrão**).
- Pode-se reutilizar o avental no mesmo paciente, desde que não esteja sujo ou úmido, deixar pendurado na entrada do quarto.
- Usar luvas para examinar o paciente
- Usar máscara cirúrgica durante o atendimento

Atendimento na unidade de terapia intensiva

- **Cuidados específicos: paciente em assistência ventilatória**
 - Manter sistema de aspiração traqueal fechado.
 - Ao aspirar a boca e nasofaringe, intubar ou fazer broncoscopia (que geram aerossóis) instituir **precaução por aerossóis**:
 - Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente;
 - Usar óculos, gorros, máscara e avental.
 - Colocar a máscara PFF2 (N95).
 - Manter a porta do quarto fechada durante o procedimento.

Atendimento na unidade de terapia intensiva

- Os EPIs nesta situação devem ser reaproveitados com os seguintes cuidados:
 - **Avental:** desde que não haja umidade ou sujidade para o mesmo paciente, manter pendurado na entrada do quarto.
 - **Máscara PFF2/N95:** utilizar uma máscara cirúrgica sobre a mesma, e após os procedimentos que geram aerossóis, como a aspiração, retirar as luvas, higienizar as mãos e retirar a máscara cirúrgica não tocando na parte anterior, apenas nas tiras, desprezar, higienizar novamente as mãos e somente depois, retirar a máscara com filtro e guardá-la.
 - **Óculos:** higienizar após cada uso, com água e sabão.
 - Desprezar no final do plantão **todos** os EPIs (avental e máscara utilizados nas situações de geração de aerossóis)

Atendimento na unidade de terapia intensiva

- Cuidados com o respirador e equipamentos:
 - Higienização das superfícies com álcool 70%.
 - Os circuitos devem ser trocados apenas entre pacientes ou se sujos ou mal funcionantes.
 - Os circuitos devem sofrer processo de limpeza e desinfecção de alto nível ou esterilização.

Fluxo de trabalho dos diversos funcionários

- **Nutrição:** A copeira deverá usar máscara cirúrgica e luvas de procedimento para entrega e/ou retirada da alimentação, sendo desnecessário o uso do avental por não haver o contato com o paciente - recolher todos os utensílios da dieta, colocar no carrinho de transporte, descartar as luvas antes de tocar em qualquer coisa (alça do carrinho, portas etc);
 - lavar as mãos
 - higienizar o carrinho de transporte sempre após o uso com água e sabão e álcool 70%

Fluxo de trabalho dos diversos funcionários

- **Zeladoria:** Durante a execução da limpeza diária, o funcionário deverá usar máscara cirúrgica (em presença de pacientes) e a mesma luva de borracha, balde com água e sabão líquido (se houver necessidade de descontaminação, usar hipoclorito de sódio a 1% e o álcool a 70% para superfícies, (conforme a rotina). Pano e demais acessórios deverão ser lavados e desinfetados com hipoclorito e guardados de acordo com a rotina;
 - lembrar de lavar as luvas de borracha, secar e depois **lavar as mãos.**

Profilaxia pós-exposição

- Caso ocorra exposição acidental do colaborador durante o atendimento o médico do SCIH deverá avaliar cada caso, em conjunto com o médico de plantão, a dispensação e indicações de quimioprofilaxia.

Visitantes e acompanhantes

- As visitas devem ser restritas (um visitante por dia), porém, deve ser de acordo com a rotina pré-estabelecida assim como os acompanhantes. Sugerimos adequar de acordo com disponibilidade de EPIs e situação específica do paciente

Tempo de manutenção de precaução

- Manter em precaução por gotículas por 07 dias.
- Pacientes graves em uso de oseltamivir por 10 dias, manter em precaução enquanto durar o tratamento específico.
- Pacientes imunodeprimidos manter em precaução por 14 dias.

Em situações de óbito

- Pacientes com quadro de SRAG que evoluam para óbito antes de tempo hábil para coleta de secreção para pesquisa viral, devem ter sua secreção (material) coletada no post- mortem imediato (informação epidemiológica).
- Recomendamos que o corpo seja preparado com atenção a higienização adequada (lavar bem com água e sabonete, inclusive o cabelo).
- O velório deve ser realizado de acordo com as recomendações atuais, sem restrições, porém, com orientações de não tocar ou beijar o corpo.

HIGIENE RESPIRATÓRIA/ETIQUETA DA TOSSE

As recomendações abaixo fazem parte da campanha *Cover Your Cough* . São atitudes simples e fáceis de tomar no dia a dia que podem evitar a disseminação de vírus, bactérias e a ocorrência de epidemias. Vale seguir esses conselhos.

- Cubra a boca e o nariz com um lenço quando tossir ou espirrar.
- Tussa ou espirre no seu antebraço, não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação.
- Coloque o lenço usado no lixo.
- Limpe as mãos depois de tossir ou espirrar. Lave-as com água e sabão e seque-as com papel toalha.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CDC - Guidelines for Isolation Precautions in Hospitals. **Infect. Control. Hosp. Epidemiol.** 2007.

CDC – Guideline for Hand Hygiene in Health Care Setting. **MMWR.** 2002; 51 (RR16):1-44.

Manual Para Prevenção das Infecções Hospitalares. CCIH- HU/USP, 2005.

site: www.who.org Influenza virus. acesso em 04 de maio de 2009.

www.cdc.gov/flu/professional/infectioncontrol/maskguidance.htm

Brasil. Ministério da Saúde. **PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA.** v.III. Brasília, 05 de agosto de 2009.

Santa Catarina. Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **NOTA TÉCNICA Nº. 08/09/DIVE/SES**

PREVENÇÃO É PRIMÁRIA!

*Protege paciente...protege os profissionais da
saúde... Promove a qualidade no atendimento!*