



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - CFT/DIAF/SES

Picossulfato de sódio solução oral 7,5 mg/ml

1. **Indicações** – constipação
2. **Diagnóstico através de avaliação clínica e exames complementares** – diagnóstico por anamnese clínica
3. **Critérios de inclusão** - uso via sonda gastro intestinal para pacientes graves
4. **Critérios de exclusão** - não tem
5. **Dose recomendada**
 - 5.1. **Adulto** dose usual 5 a 10 mg (10 a 20 gotas), VO, 1x/dia, preferencialmente à noite
 - 5.2. **Pediatria** crianças entre 4 e 10 anos dose usual 2,5 a 5mg (5 a 10 gotas) , VO, 1x/ dia, preferencialmente à noite
 - 5.3. **Neonatologia** menores de 04 anos dose usual 0,25 mg/kg/dia, VO, à noite.
6. **Monitorização laboratorial** - não tem
7. **Tempo de tratamento estimado** - Não deve ser utilizado diariamente por períodos prolongados. Enquanto durarem os sintomas.
8. **Associações possíveis** - Lactulose xarope
9. **Procedimento em caso de evolução clínica desfavorável** - suspender o uso
10. **Referências**

Conforme Formulário de Solicitação.