

## **PROTOCOLO CLINICO PARA O USO DE ANFOTERICINA B FORMA LIPIDICA EM UTI NEONATAL**

### **INDICAÇÕES:**

- RN COM EXTREMO BAIXO PESO (< 1.000G)
- INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA DE QUALQUER CAUSA
- DISFUNÇÃO RENAL COM USO DA ANFOTERICINA B CONVENCIONAL
- FALHA DO TTO CONVENCIONAL (ANFOT. B CONV. + FLUCONAZOL)
- USO DE MAIS DE 2 DROGAS NEFROTÓXICAS, CASO NÃO POSSA SUSPENDER

### **DOSE RECOMENDADA:**

5MG/KG/DIA EV 24/24 HORAS

### **VELOCIDADE DE INFUSÃO:**

2,5 ML/H EM 2 HORAS

### **DILUIÇÃO:**

SG5%

### **MONITORAÇÃO:**

INÍCIO DO TTO: HEMOCULTURA

APÓS: COLETAR A CADA 48 HORAS ATÉ NEGATIVAR

1 VEZ/SEMANA: TGO, TGP, URÉIA, CREATININA E HEMOGRAMA

### **TEMPO DE TRATAMENTO:**

14 DIAS após negativar TODAS culturas e evidência de resolução clínica e laboratorial, conforme **FLUXOGRAMA** a seguir:

