


DOENÇA DE PARKINSON	
Portaria SCTIE/MS nº 10 – 31/10/2017	
Medicamento	PRAMIPEXOL
CID 10	G20
Apresentação	0,125 mg; 0,25 mg e 1 mg (comprimido)
Inclusão	Apresentar os critérios para o diagnóstico clínico da Doença de Parkinson segundo o Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido: - Bradicinesia (lentidão dos movimentos); - Mais um (1) critério diagnóstico ; - E pelo menos três critérios de suporte positivo .
Anexos Obrigatórios	Formulário Médico para Parkinson completamente preenchido e assinado pelo médico e pelo paciente.
Administração	2 a 4,5 mg/dia 3x/dia. Recomenda-se o aumento gradual da dose. Iniciar com 0,125 mg 3x/dia e aumentar a cada 5-7 dias sucessivamente para 0,75 mg/dia; 1,5 mg/dia; 2,25 mg/dia; 3 mg/dia; 3,75 mg/dia; 4,5 mg/dia.
Prescrição Mensal Máxima	1116 cp (0,125 mg) 558 cp (0,25 mg) ou 140 cp (1 mg).
Monitoramento	Clínico com avaliação dos efeitos adversos para cada medicamento, a critério médico.
Exclusão	Hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos.
Tempo de Tratamento	Enquanto for observado benefício clínico sintomático.
Medicamento	AMANTADINA
Medicamento	BROMOCRIPTINA
CID 10	G20
Apresentação	100 mg (comprimido) 2,5 mg (comprimido)
Inclusão	Apresentar os critérios para o diagnóstico clínico da Doença de Parkinson segundo o Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido: - Bradicinesia (lentidão dos movimentos); - Mais um (1) critério diagnóstico ; - E pelo menos três critérios de suporte positivo .
Anexos Obrigatórios	Formulário Médico para Parkinson completamente preenchido e assinado pelo médico e pelo paciente. Exames: Creatinina e ureia
Administração	100 mg/2x/dia; aumentar, se necessário, até 400 mg/dia. Não descontinuar abruptamente, retirar gradualmente em 1-2 semanas. 7,5 a 70 mg/dia e deve ser aumentada conforme resposta clínica e tolerabilidade.
Prescrição Mensal Máxima	124 comprimidos 868 comprimidos
Monitoramento	Clínico com avaliação dos efeitos adversos para cada medicamento, a critério médico.
Exclusão	Hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos
Tempo de Tratamento	Enquanto for observado benefício clínico sintomático.
Medicamento	ENTACAPONA
CID 10	G20
Apresentação	200 mg (comprimido)

Inclusão	Apresentar os critérios para o diagnóstico clínico da Doença de Parkinson segundo o Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido: - Bradicinesia (lentidão dos movimentos); - Mais um (1) critério diagnóstico ; - E pelo menos três critérios de suporte positivo .	
Anexos Obrigatórios	Formulário Médico para Parkinson completamente preenchido e assinado pelo médico e pelo paciente.	
Administração	200 mg 4 a 10x/dia. Dose máxima 2.000 mg/dia	
Prescrição Máxima Mensal	310 comprimidos.	
Monitoramento	Clínico com avaliação dos efeitos adversos para cada medicamento, a critério médico.	
Exclusão	Apresentar contraindicação ou intolerância ao medicamento.	
Tempo de Tratamento	Enquanto for observado benefício clínico sintomático.	
Medicamento	CLOZAPINA	RASAGILINA
CID 10	G20	
Apresentação	25 mg e 100 mg (comprimido)	1 mg (comprimido)
Inclusão	Apresentar os critérios para o diagnóstico clínico da Doença de Parkinson segundo o Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido: - Bradicinesia (lentidão dos movimentos); - Mais um (1) critério diagnóstico ; - E pelo menos três critérios de suporte positivo .	
Anexos Obrigatórios	Formulário Médico para Parkinson completamente preenchido e assinado pelo médico e pelo paciente.	
	Exame: Hemograma	
Administração	12,5 mg/dia, com possibilidade de incremento de 25 mg a cada 2 dias. A dose média efetiva fica geralmente entre 25 e 37,5 mg/dia. No caso em que o tratamento, por pelo menos uma semana, com a dose de 50 mg/dia não obteve resposta terapêutica satisfatória, a dose pode ser cuidadosamente aumentada em 12,5 mg/semana. A dose máxima de 100 mg/dia nunca deverá ser ultrapassada.	1 mg, uma vez ao dia.
Prescrição Máxima Mensal	124 cp (25 mg) ou 31 cp (100 mg)	31 comprimidos
Monitoramento	Clínico com avaliação dos efeitos adversos para cada medicamento, a critério médico.	
Exclusão	Hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos.	
Tempo de Tratamento	Enquanto for observado benefício clínico sintomático.	
Associações Não Permitidas	- Bromocriptina + Pramipexol; - Entacapona + Tolcapona; - Selegilina + Rasagilina.	
Validade dos exames	Creatinina, ureia, AST, ALT e hemograma: 6 meses.	
Especialidade Médica	Novas Solicitações e Adequações	Conforme PCDT não há exigência de especialidade.
	Renovações Sem Alterações	Conforme PCDT não há exigência de especialidade.
CID-10: G20 Doença de Parkinson		



DIAF

Diretoria de Assistência
Farmacêutica