



ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA

**OFICINA DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO Á
SAÚDE DAS PESSOAS COM OSTOMAS
INTESTINAIS E/OU URINARIOS E FÍSTULAS
CUTÂNEAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**



PROFºENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA do Curso de Esp.em Estomoterapia da UNESC.

Ms.em Ciências da Saúde

Enfº da S.M.S de Criciúma.

Responsável Técnico pelo Polo de Atenção ao Ostomizado de Criciúma e Região.

Membro da Câmara Técnica da SES-SC.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA


- A troca do sistema coletor é realizada a cada 4 ou 6 dias;
- Nas colostomias úmidas a cada 5 dias;
- Nas lleostomias entre 3 a 4 dias;
- Nas urostomias entre 2 e 3 dias.
- OBS: Pacientes com derivações urinárias é comum a saída de muco na urina, pois a mucosa intestinal do conduto urinário produz muco.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA

- Pacientes com colostomias e lleostomias devem ser orientados a realizar as trocas pela manhã;pois á menor eliminação de efluente;
- Nas primeiras 6 a 8 semanas o estoma vai reduzindo de tamanho.
- A placa deve ser recortada de forma a deixar,no máximo 3mm de pele descoberta e não garrotear a mucosa do estoma.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA

Colostomia úmida: Os ureteres são implantados no segmento distal da colostomia ou ileostomia em alça, permitindo a confecção de um único estoma com saída de fezes no segmento proximal e urina no segmento distal.



Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

- Higiene do estoma e pele periestomia: realizada cuidadosamente com água morna e sabonete;
- Remover pelos Peri ostoma, com tesoura romba.

Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

Observação da estomia e pele periestomia:

- Cor: vermelho brilhante:



Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

Observação da estomia e pele periestomia:

- Forma:regular ou Irregular.



Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

Observação da estomia e pele periestomia:

Tamanho em (mm):



Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

Observação da estomia e pele periestomia:

- Protrusão ou altura da estomia:




Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

Observação da estomia e pele periestomia:

- Umidade:aparência úmida e aspecto brilhante,observados pela presença de muco intestinal.



Avaliação e Complicações do Ostoma

AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUTOCUIDADO:

Observação da estomia e pele periestomia:



Avaliação e Complicações do Ostoma

Complicações dos Ostomas:

Prevenção e Tratamento.

As complicações representam o resultado de quatro fatores:

1. Erro no diagnóstico;
2. Na técnica ;
3. Resultado da doença;
4. cuidado.

(Krestschmer, **Esomas Intestinais**.Ed.Interamericana.1982 pag-64,65)

Avaliação e Complicações do Ostoma

Complicações da ileostomia:

Erosões Cutâneas; resulta da exposição da pele ás excreções corrosivas da ileostomia.

Causas:

1. Ileostomia ao nível da pele;
2. Retração ou formação de fistula.

(Krestschmer, **Esomas Intestinais**.Ed.Interamericana.1982 pag-64,65)

Avaliação e Complicações do Ostoma

Complicações da ileostomia:

Causas:(continuação).

- 3.Localização em íntima proximidade ,com cicatrizes ou com proeminências corporais;
- 4.alergia aos materiais;
- 5.trocas frequentes;
- 6.alimentos que irritam;
- 7.Má adaptação do equipamento.

Avaliação e Complicações do Ostoma

Prevenção:

1. Sutura sem tensão;
2. Uso de equipamento adequado;
3. Eliminar alimentos irritantes;
4. Higiene do estoma.

(Krestschmer, **Esomas Intestinais**.Ed.Interamericana.1982 pag-64,65)



Play ►

Avaliação e Complicações do Ostoma

RETRAÇÃO DO ESTOMA

Causas:

1. Sutura sob tensão;
2. Fixação insuficiente do estoma no peritônio;
3. Infecções ou abscessos periostomais;
4. Aumento de peso.

(Krestschmer, **Esomas Intestinais**.Ed.Interamericana.1982 pag-64)






Avaliação e Complicações do Ostoma

Tratamento Local.

Uso de bolsa convexa.



Avaliação e Complicações do Ostoma


鑫 Necrose do Estoma:

鑫 Causas:

1. Comprometimento do suprimento sanguíneo;
2. Suturas sobtensão;
3. Torção do tubo intestinal.

Tratamento:

Laparotomia e reconstrução do estoma.





WOCN Image Library

Avaliação e Complicações do Ostoma

Prolapso :

Protrusão da alça intestinal.

Causas:

1. Abertura do estoma exagerada na parede abdominal;
2. Fixação insuficiente do estoma no peritônio;
3. Pressão excessiva exercida por aparelho de estomia.

Krestschmer, **Esomas Intestinais**.Ed.Interamericana.1982 pag-67,68)





Avaliação e Complicações do Ostoma

Sangramento ou Hemorragia:

Avaliarmeticulosamente o estoma;

Fazer compressão digital;

Utilizar bolsa de duas peças;

Medir o efluente drenado e registrar características;

Orientar a pessoa estomizada e/ou familiar sobre a possibilidade de ocorrerem pequenos sangramentos.

.(Cesaretti R.U.Isabel,Paula de Boccaro A. Maria,Paula R. Pedro,ESTOMOTERAPIA: Temas Básicos em Estoma.Ed.Cabral,2006).



Avaliação e Complicações do Ostoma

Edema:

Manter bolsa transparente;

Registrar coloração.

(Cesaretti R.U.Isabel,Paula de Boccara A. Maria,Paula R. Pedro,ESTOMOTERAPIA: Temas Básicos em Estoma.Ed.Cabral,2006).



Avaliação e Complicações do Ostoma

Estenose:

Valorizar queixas de:

- flatulência excessiva;
- afinamento das fezes;
- expulsão explosiva de fezes pelo estoma
- dor abdominal.





Avaliação e Complicações do Ostoma

Hérnia para estomal;

- Utilizar equipamento de barreira flexível;
- Cinto elástico;
- Evitar esforço físico;
- Encaminhar ao nutricionista;
- Observar sinais de oclusão intestinal; dor, distensão abdominal).

(Cesaretti R.U.Isabel,Paula de Boccaro A. Maria,Paula R. Pedro,ESTOMOTERAPIA: Temas Básicos em Estoma.Ed.Cabral,2006).





Avaliação e Complicações do Ostoma


















UROSTOMIAS: Ocorre incrustações ou presença de cristais que ficam depositados na mucosa do estoma, pele periestomal ou placa protetora

A abrasão destes cristais pode ferir a mucosa do estoma causando hematúria.

Prevenção de Lesão da Pele:

Aplicar compressas de ácido acético na região periestomal por 30 minutos duas a três vezes ao dia.







Avaliação e Complicações do Ostoma

A dermatite de contato: é uma reação inflamatória que ocorre na pele devido à exposição a um componente que causa irritação ou alergia.













REFERÊNCIAS:

- 1.Matsubara S.G das Maria ,Villela L.Diana,Hsahimoto Y.Soraya,Reias S.da Comercide Hheidy –**FERIDAS e Estomas em Oncologia (Uma Abordagem Interdisciplinar)**,Ed.Lemar, SP,2012.
- 2.Cesaretti R. U. Isabel,SantosGouveia de C.L.Vera, Assistência em ESTOMOTERAPIA.Cuidando do Ostomizado.Ed.Atheneu 2005.

- 1.Paula de Boccaro A.Maria,Paula de R. Pedro,Cesaretti R. U. Isabel,Estomoterapia em Foco e o Cuidado Especializado,Ed.Yendis,2015;



Obrigado

ronaldoperfoll1963@gmail.com

ronaldoperfoll@unesc.net

Watsap:48-996970138

48:3431-4538