Noções importantes no controle de infecções em neonatologia

X Seminário de prevenção e controle de infecção em serviços de saúde em Santa Catarina

Simone Suplicy Vieira Fontes

Importância.....

As definições dos critérios diagnósticos de infecção para a vigilância epidemiológica das IRAS em serviços de saúde permite a harmonização necessária para identificar o caso, coletar e interpretar as informações de modo sistematizado pelos profissionais e gestores do sistema de saúde.

ANVISA 2017

Casos clínico 1

RN de 1400 gramas ao nascer (DN 10/11/2018) com quadro de anóxia perinatal grave, sendo instalado um cateter umbilical arterial e venoso, e colocado em ventilação mecânica. No dia 15/11 apresentou febre, bradicardia, hipotensão, RX de tórax sem alteração. HMG alterado e PCR > 10mg/l e então coletadas 2 hemoculturas que foram positivas para Stafilococos epidermidis. Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

Preciso saber.....

- ✓ **RN entra na vigilância?**
- ✓ **Quais os critérios?**
- ✓ **Quais dispositivos está usando?**
- ✓ **Está com infecção?**
- ✓ **Como classificar a infecção?**
- ✓ **Está usando antibiótico? Tem cultura positiva?**

RN entra na vigilância?

Quais os critérios?

RN entra na vigilância? Quais os critérios?

Recém-nascidos que preenham pelo menos um dos seguintes critérios:

- Peso ao nascimento < 1500g;**
- Uso de assistência ventilatória (RN em ventilação mecânica sob entubação ou traqueostomia);**
- Uso de cateter central (cateter central de inserção periférica - PICC, cateter umbilical, flebotomia, etc);**

RN entra na vigilância? Quais os critérios?

- **Pós-operatório;**
- **Presença de quadro infeccioso com manifestação sistêmica (ex.: pneumonia, sepse, enterocolite, meningite, etc).**
- **Até quando monitorar → enquanto permanecerem na unidade de terapia intensiva neonatal ou unidade de cuidados intermediários e deixarão de fazer parte deste tipo de vigilância quando os RN saírem de alta da unidade neonatal ou até 90 dias de vida.**

A newborn baby is lying on a white blanket. A medical sensor is attached to the baby's right foot. The text is overlaid on the image.

RN entra na vigilância?

SIM

Quais os critérios?

Casos clínico 1

RN de **1400 gramas ao nascer** (DN 10/11/2018) com quadro de anóxia perinatal grave, sendo instalado um **cateter umbilical arterial e venoso**, e colocado em **ventilação mecânica**. No dia 15/11 apresentou febre, bradicardia, hipotensão, RX de tórax sem alteração.

HMG alterado e PCR > 10, então coletadas 2 hemoculturas que foram positivas para Stafilococos epidermidis.

Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

A photograph of a person's feet, with the right foot having a small, yellow, circular device attached to the side. The feet are resting on a light-colored, textured surface. The text "Quais dispositivos estão usando?" is overlaid in the center of the image.

Quais dispositivos estão usando?

Casos clínico 1

RN de 1400 gramas ao nascer (DN 10/11/2018) com quadro de anóxia perinatal grave, sendo instalado um **cateter umbilical arterial e venoso**, e colocado em **ventilação mecânica**. No dia 15/11 apresentou febre, bradicardia, hipotensão, RX de tórax sem alteração.

HMG alterado e PCR > 10, então coletadas 2 hemoculturas que foram positivas para *Stafilococcus epidermidis*.

Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

Quantos CVC são considerados ?

Apesar de serem 2 cateteres centrais (umbilical arterial e venoso) para vigilância das IRAS deve ser contado 1 CVC no dia e não 2.

As infecções de corrente sanguínea de aparecimento precoce (até 48 horas) não deverão ser computadas como associadas a dispositivo mesmo que o RN tenha um cateter vascular central presente.

A photograph of a person's feet, with a daisy flower placed on the right foot. The text "Está com infecção?" is overlaid in the center of the image.

Está com infecção?

Casos clínico 1

RN de 1400 gramas ao nascer (DN 10/11/2018) com quadro de anóxia perinatal grave, sendo instalado um cateter umbilical arterial e venoso, e colocado em ventilação mecânica. No dia 15/11 apresentou febre, bradicardia, hipotensão, RX de tórax sem alteração.

HMG alterado e PCR > 10mg/l, então coletadas 2 hemoculturas que foram positivas para *Stafilococcus epidermidis*.

Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

A photograph of a person's feet, with a daisy flower placed on the right foot. The text "Como classificar a infecção?" is overlaid in the center of the image.

Como classificar a infecção?

Classificação das infecções

TRANSPLACENTÁRIA (INFECÇÃO CONGÊNITA)

Ex.: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, hepatite B e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV), zika, chikungunya e dengue.

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) EM NEONATOLOGIA

IRAS PRECOCE $\leq 48h$

IRAS TARDIA $> 48h$

Os indicadores das IRAS transplacentárias deverão ser avaliados separadamente das IRAS precoce ou tardia

ANVISA 2017

A photograph of a pair of feet, likely a child's, resting on a light-colored, textured surface. A small white daisy flower with a yellow center is placed on the right foot. The image is slightly blurred, and the text is overlaid in a dark blue, bold font.

Como classificar a infecção?

Precoce ou tardia?

Casos clínico 1

RN de 1400 gramas ao nascer (**DN 10/11/2018**) com quadro de anóxia perinatal grave, sendo instalado um cateter umbilical arterial e venoso, e colocado em ventilação mecânica. No dia **15/11** apresentou febre, bradicardia, **hipotensão**, RX de tórax sem alteração. HMG alterado e PCR > 10, então coletadas 2 hemoculturas que foram positivas para *Stafilococcus epidermidis*. Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

A close-up photograph of a newborn baby's feet. The baby is wearing a white diaper. On the right foot, there is a small, circular, yellowish mark on the sole. The background is a light-colored, textured surface, possibly a bedsheet or blanket.

Como classificar a infecção?

Precoce ou tardia?

Tardia → sintomas com 5 dias de vida

Infecção Tardia (origem hospitalar)

Infecção cuja evidência diagnóstica (clínica / laboratorial /microbiológica) ocorre após as primeiras 48 horas de vida.

Será considerada como IRAS neonatal tardia, de origem hospitalar, aquela infecção diagnosticada enquanto o paciente estiver internado em Unidade de Assistência Neonatal.

Infecção Tardia (origem hospitalar)

Após a alta hospitalar seguir as orientações do quadro abaixo:

Sítio da Infecção	Período de Incubação
-Gastrenterite -Infecções do trato respiratório	Até 03 dias
-Sepse -Conjuntivite -Impetigo -Onfalite -Outras infecções cutâneas -Infecção do trato urinário	Até 07 dias
Infecção do sítio cirúrgico sem prótese	Até 30 dias do procedimento
Infecção do sítio cirúrgico com prótese	Até 90 dias do procedimento

A photograph of a person's feet resting on a white, textured towel. The right foot has a single white daisy flower with a yellow center placed on the sole. The background is a light-colored, possibly wooden, floor.

Infecção tardia em qual topografia?

Infecção neonatal por topografia

- **Infecção Primária da Corrente Sanguínea com confirmação microbiológica (IPCSL) – Sepse comprovada laboratorialmente**
- **IPCS sem confirmação microbiológica – (IPCSC) Sepse Clínica**
- **Infecções do Sistema Cardiovascular**
- **Trato Respiratório – PNEUMONIA**
- **infecções do Sistema Nervoso Central**
- **Infecção do Trato Urinário**
- **Infecções do Sistema Gastrointestinal**
- **Infecção em Olhos, Ouvidos, Nariz, Garganta e Boca**
- **Pele e Tecido Celular Subcutâneo**
- **Infecções Osteoarticulares**
- **Infecções Do Sítio Cirúrgico**

Infecção primária da corrente sanguínea com confirmação microbiológica (IPCSL):

Deverá apresentar um dos seguintes critérios:

CRITÉRIO 01: Uma ou mais hemoculturas positivas por microrganismos não contaminantes da pele** e que o microrganismo não esteja relacionado à infecção em outro sítio;

*****difteróides, Propriosebacterium sp., Bacillus sp., estafilococos coagulase negativo ou micrococos***

Infecção primária da corrente sanguínea com confirmação microbiológica (IPCSL):

CRITÉRIO 02: Pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas sem outra causa não infecciosa reconhecida e sem relação com infecção em outro local (discutir com médico assistente do RN): instabilidade térmica; bradicardia; apnéia; intolerância alimentar; piora do desconforto respiratório; intolerância à glicose; instabilidade hemodinâmica, hipoatividade/letargia.

- **E pelo menos um dos seguintes:**
- **2** hemoculturas com microrganismos contaminantes comuns da pele colhidas em **dois** locais diferentes, com intervalo máximo de 48 horas entre as coletas;
- Estafilococo coagulase negativo cultivado em pelo menos **01** hemocultura periférica de paciente com cateter vascular central (CVC)

A photograph of a person's feet resting on a white, textured towel. The right foot has a small white daisy flower with a yellow center placed on the arch. The background is a light-colored, possibly wooden, floor.

Infecção tardia em qual topografia?

Casos clínico 1

RN de 1400 gramas ao nascer (DN 10/11/2018) com quadro de anóxia perinatal grave, sendo instalado um cateter umbilical arterial e venoso, e colocado em ventilação mecânica. No dia 15/11 apresentou febre, bradicardia, hipotensão, RX de tórax sem alteração. HMG alterado e PCR > 10, então coletadas 2 hemoculturas que foram positivas para *Stafilococcus epidermidis*. Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

Infecção tardia em qual topografia?

**Infecção Primária da Corrente Sanguínea
Laboratorial (IPCSSL)**

Está usando antibiótico? Tem cultura positiva?

2 hemoculturas que foram positivas para *Stafilococcus epidermidis*. Iniciado Oxacilina e após antibiograma que verificou ser resistente a oxacilina foi trocado para Vancomicina.

Atenção

O peso de nascimento (PN) é o primeiro fator de risco a ser considerado. Assim, em todos os indicadores epidemiológicos deverão ser calculados para cada faixa de peso ao nascer, estratificadas da seguinte forma: < 750g; 750g a 999g; 1000g a 1499g; 1500 g a 2499g; $\geq$ 2500g; independente da alteração do peso na data da notificação da infecção.

Caso clínico 2

RN de 1980 gramas ao nascer (DN 01/01/2018), IG:34 semanas + 3 dias, em uso de cateter umbilical venoso e VM desde o nascimento. Mãe com ITU em tratamento há 12 horas, bolsa rota 20 horas. Iniciado Ampicilina + Gentamicina. Coletado HMG que estava alterado com escore de Rodwell >3 e PCR=35mg/l, com intervalo de 24h foi coletado HMG de controle , mantendo alterado e PCR=55mg/l. Hemoculturas colhidas com resultado negativo e LCR normal e RXT normal.

RN entra na vigilância? Quais critérios?

Sim

Quais dispositivos está usando?

Caso clínico 2

RN de 1980 gramas ao nascer (DN 01/01/2018), IG:34 semanas + 3 dias, em uso de **cateter umbilical venoso e VM desde o nascimento**. Mãe com ITU em tratamento há 12 horas, bolsa rota 20 horas. Iniciado Ampicilina + Gentamicina. Coletado HMG alterado com escore de Rodwell >3 e PCR=35, com intervalo de 24h coletado HMG de controle , mantendo alterado e PCR=55. Hemoculturas colhidas com resultado negativo e LCR normal e RXT normal.

Está com infecção?

Sim

Como classificar a infecção?

Classificação das infecções

TRANSPLACENTÁRIA (INFECÇÃO CONGÊNITA)

Ex.: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, hepatite B e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV), zika, chikungunya e dengue.

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) EM NEONATOLOGIA

IRAS PRECOCE $\leq 48h$

IRAS TARDIA $> 48h$

Os indicadores das IRAS transplacentárias deverão ser avaliados separadamente das IRAS precoce ou tardia ANVISA 2017

Caso clínico 2

RN de 1980 gramas ao nascer (DN 01/01/2018), IG:34 semanas + 3 dias, em uso de cateter umbilical venoso e VM desde o nascimento. Mãe com ITU em tratamento há 12 horas, bolsa rota 20 horas. Iniciado Ampicilina + Gentamicina. Coletado HMG alterado com escore de Rodwell >3 e PCR=35, com intervalo de 24h coletado HMG de controle , mantendo alterado e PCR=55. Hemoculturas colhidas com resultado negativo e LCR normal e RXT normal.

A close-up photograph of a baby's feet wearing a white sock with a yellow daisy flower on the toe. The background is a light-colored, textured surface.

Como classificar a infecção?

Infecção precoce

Infecção Precoce (provável origem materna)

Infecção ocorre nas primeiras 48 horas de vida e existe a presença do fator de risco materno.

Definem-se como fatores de risco materno:

- bolsa rota maior que 18h;**
- cerclagem;**
- trabalho de parto em gestação menor que 35 semanas;**
- procedimentos de medicina fetal nas últimas 72 horas;**

Infecção Precoce (provável origem materna)

- **infecção do trato urinário (ITU) materna sem tratamento ou em tratamento a menos de 72 horas;**
- **febre materna nas últimas 48 horas;**
- **corioamnionite;**
- **colonização pelo estreptococo B em gestante, sem quimioprofilaxia intra-parto, quando indicada.**

Infecção precoce em qual topografia?

Infecção primária da corrente sanguínea sem confirmação microbiológica (IPCSC):

Critério 01: Pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas sem outra causa conhecida (discutir com médico assistente do RN): instabilidade térmica; bradicardia; apnéia; intolerância alimentar; piora do desconforto respiratório; intolerância à glicose; instabilidade hemodinâmica, hipoatividade/letargia

E todos os seguintes critérios:

- Hemograma com ≥ 3 parâmetros alterados (consultar escore hematológico) e/ou Proteína C Reativa quantitativa alterada
- Hemocultura não realizada ou negativa;
- Ausência de evidência de infecção em outro sítio;
- Terapia antimicrobiana instituída pelo médico assistente.

Caso clínico 2

RN de 1980 gramas ao nascer (DN 01/01/2018), IG:34 semanas + 3 dias, em uso de cateter umbilical venoso e VM desde o nascimento. Mãe com ITU em tratamento há 12 horas, bolsa rota 20 horas. Iniciado Ampicilina + Gentamicina. **Coletado HMG alterado com escore de Rodwell >3 e PCR=35, com intervalo de 24h coletado HMG de controle , mantendo alterado e PCR=55. Hemoculturas colhidas com resultado negativo e LCR normal e RXT normal.**

Infecção precoce em qual topografia?

**Infecção primária da corrente sanguínea
clínica ou seja sem confirmação
laboratorial**

IPCSC

Está usando antibiótico? Tem cultura positiva?

Iniciado Ampicilina + Gentamicina.

HMC negativas

A photograph of a person's feet resting on a white, textured towel. The feet are positioned side-by-side, with the right foot slightly in front of the left. A single daisy flower with a yellow center and white petals is placed on the right foot. The background is a plain, light-colored surface.

Observações importantes

Escore de Rodwell

Escore hematológico que considera um ponto para cada uma das seguintes características:

- **Leucocitose ou leucopenia (considerar leucocitose ≥ 25.000 ao nascimento ou ≥ 30.000 entre 12 e 24 horas ou acima de $21.000 \geq 48$ horas. Considerar leucopenia ≤ 5.000)**
- **Neutrofilia ou neutropenia;**
- **Elevação de neutrófilos imaturos;**
- **Índice neutrofílico aumentado;**
- **Razão dos neutrófilos imaturos sobre os segmentados $\geq a 0,3$;**
- **Alterações degenerativas nos neutrófilos com vacuolização e granulação tóxica;**
- **Plaquetopenia ($<150.000/mm^3$).**

Escore de Rodwell

	NEUTROPENIA		NEUTROFILIA		↑IMATUROS	
	PN <1,5kg*	PN>1,5kg#	PN <1,5kg*	PN >1,5kg#	Imaturos# *	Totais# *
Nascimento	< 500	< 1.800	> 6.300	> 5.400	> 1.100	> 0,16
12 horas	<1.800	< 7.800	> 12.400	> 14.500	> 1.500	> 0,16
24 horas	< 2.200	< 7.000	> 14.000	> 12.600	> 1.280	> 0,16
36 horas	< 1.800	< 5.400	> 11.600	> 10.600	> 1.100	> 0,15
48 horas	< 1.100	< 3.600	> 9.000	> 8.500	> 850	> 0,13
60 horas	< 1.100	< 3.000	> 6.000	> 7.200	> 600	> 0,13
72 horas	< 1.100	< 1.800	> 6.000	> 7.000	> 550	> 0,13
120 horas	< 1.100	< 1.800	> 6.000	> 5.400	> 500	> 0,12
4º ao 28º dia	< 1.100	< 1.800	> 6.000	> 5.400	> 500	> 0,12

Fonte: Manroe et al., 1979; *Mouzinho et al., 1994.

Um escore ≥ 3 oferece sensibilidade de 96% e especificidade de 78%, e um escore de 0, 1 ou 2 fornece valor preditivo negativo de 99%. Embora útil, não se constitui isoladamente ainda em um teste definitivo para o diagnóstico da sepse, uma vez que não identifica todos os neonatos sépticos.

PCR

Valor normal da PCR menor que $1\text{mg/dL} = 10\text{mg/l}$ pelos métodos quantitativos (por exemplo: nefelometria). Os métodos qualitativos e quantitativos pelo látex não estão validados para esta finalidade.

O PCR alterado isoladamente não deve ser utilizado como parâmetro para indicação de tratamento ou diagnóstico de infecção.

Considerar que as causas **não infecciosas** podem elevar a PCR: síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular, síndrome da aspiração do mecônio e outros processos inflamatórios.

Cateteres centrais

- **Cateter umbilical arterial → retirar em 5 dias no máximo;**
- **Cateter umbilical venoso → retirar em 7 dias no máximo;**
- **PICC → não tem tempo máximo estipulado, estudos dizem que após 14 dias aumenta o risco de infecção. Atenção para sinais de mal funcionamento, flebite ou infecção local → retirada!!**
- **Avaliar todos os dias a possibilidade de retirada e fazê-la assim que não for mais necessário a utilização, nunca postergar!**

Situações estressantes simulam sepse.....

➤ Muitos procedimentos desnecessários (coletas, manuseio, etc)

➤ Barulho, conversas...

➤ Muita claridade

➤ Manipulação → lembrar da importância da hora do soninho

Obrigada