



# ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

**NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 03/2025**  
**Critérios Diagnósticos das infecções relacionadas à**  
**assistência à saúde de notificação nacional obrigatória –**  
**ano: 2025**

Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde  
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde  
Terceira Diretoria  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Brasília, 02 de janeiro de 2025

**Terceira Diretoria – DIRE3**

Danitza Passamai Rojas Buvnich

**Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - GGTES**

Márcia Gonçalves de Oliveira

**Gerência de Vigilância e Monitoramento em serviços de Saúde – GVIMS**

Magda Machado de Miranda Costa

**Equipe Técnica GVIMS/GGTES**

Ana Clara Ribeiro Bello dos Santos

André Anderson Carvalho

Andressa Honorato Miranda de Amorim

Cleide Felicia de Mesquita Ribeiro

Daniela Pina Marques Tomazini

Heiko Thereza Santana

Humberto Luiz Couto Amaral de Moura

Lilian de Souza Barros

Luciana Silva da Cruz de Oliveira

Mara Rúbia Santos Gonçalves

Maria Dolores Santos da Purificação Nogueira

Uiara Cavalcante Silva

**Elaboração e revisão do conteúdo nas versões anteriores**

Equipe Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/Anvisa e

Grupos Técnicos que prestam apoio à Anvisa (citados abaixo)

Comissão Nacional de Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CNCIRAS/Anvisa)

Câmara Técnica de Resistência Microbiana em serviços de saúde (CATREM/Anvisa)

Coordenações Estaduais/Distrital de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH/CDCIH)

**Grupo Técnico de revisão dos critérios diagnósticos de Infecção de Corrente Sanguínea**

Ana Cristina Gales Daiane Patrícia Cais  
Dirceu Carrara  
Debora Otero Britto Passos Pinheiro  
Fernanda Justo Descio Bozola Nádia  
Mora Kuplich  
Raquel Bauer Cechinel  
Renata Desordi Lobo (coordenadora)  
Silmara Elaine Malaguti Toffano Thaís  
Faber Gomes

**Grupo Técnico de revisão dos critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico**

Adriana Macêdo Dell'Aquila  
Ana Lúcia Lei Munhoz Lima  
Anna Karenine Braúna Cunha  
Eliana Lima Bicudo  
Ivanise Arouche Gomes de Souza  
José David Urbaz Brito  
Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti  
Julival Fagundes Ribeiro  
Julia Herkenhoff Carijó  
Mauro José Costa Salles (coordenador)  
Tânia Mara Varejão Strabelli

**Grupo Técnico de revisão dos critérios diagnósticos de infecção do trato urinário**

Amanda Luiz Pires Maciel  
Ana Rubia Guedes Vinhole  
Andrea Pio Abreu  
Bianca Leal de Almeida  
Cristiane Feitosa Salviano  
Dejanira Aparecida Regagnin  
Eliane Carosso Krummennauer  
José Carlos Souza Trindade Filho  
Marcelo Carneiro  
Marcos Antonio Cyrillo  
Maura Salaroli de Oliveira  
Paulo Laste  
Priscila Rosalba Domingos de Oliveira

**Grupo Técnico de revisão dos critérios diagnósticos de infecções do trato respiratório relacionadas à assistência à saúde**

Carolina Fu  
Celi Novaes Vieira  
Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros  
Fabiana Silva Vasques  
Marcelo de Oliveira Maia Ariane Baptista  
Monteiro Cláudia Vallone Silva  
Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal Camila de Freitas  
Ismael Lucas Pinto  
Raquel Afonso Caserta Eid Luís Fernando  
Waib  
Maria Inês Bueno de André Valery

**Grupo Técnico de revisão dos critérios diagnósticos de infecções relacionadas a assistência a saúde em Pediatria**

Bellisa Caldas Lopes Bruno de Melo Tavares  
Fabiana Silva Vasques Jaqueline Dario  
Capobiango Karina Peron  
Marcelo Otsuka Mariana Volpe Arnoni Raquel  
Bauer Cechinel  
Rosana Maria Rangel dos Santos Rubiane  
Gouveia de Souza e Silva Suzana Vieira da  
Cunha Ferraz

**Grupo Técnico de revisão dos critérios diagnósticos de infecções relacionadas a assistência a saúde em Neonatologia**

Ana Paula Gomes Alcântara Villa Nova Camila  
Almeida  
Guilherme Augusto Armond  
Irna Carla do Rosário Souza Carneiro Raquel  
Bauer Cechinel  
Rosana Maria Rangel dos Santos  
Rosana Richtmann (coordenadora) Roseli Calil  
Suzana Vieira da Cunha Ferraz

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA

É permitida a reprodução parcial ou total deste documento, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta Nota Técnica é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

# SUMÁRIO

1. Introdução	5
2. Conceitos, orientações gerais e exemplos para a aplicação dos critérios diagnósticos	8
a. Período de janela da infecção	8
b. Data da infecção	9
c. Infecção presente na admissão	10
d. IRAS associada ao uso de dispositivos invasivos	11
e. Unidade/Serviço de atribuição da infecção	18
f. Prazo para infecções de repetição (PIR)	19
g. Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS)	26
h. Cateter central	27
i. Pneumonia	29
j. Infecção do trato urinário sintomática (ITU)	29
3. Critérios Diagnósticos das IRAS associadas a dispositivos invasivos, de notificação obrigatória	31
Referências	81
ANEXO 1 Infecção de Corrente Sanguínea (ICS) Secundária	84
ANEXO 2 Checklist dos itens a serem observados nos critérios diagnósticos de IRAS associadas a dispositivos invasivos	95



**Atenção!** Essa Nota Técnica é uma revisão da Nota Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 03/2024. Não ocorreram alterações no capítulo 1. No capítulo 2 onde havia <math><35^{\circ}\text{C}</math> foi alterado para <math><36^{\circ}\text{C}</math>. Já no capítulo 3, ocorreram muitas alterações nos critérios das ISC, desta forma, sugerimos que seja lido com bastante atenção.

## 1. Introdução

A definição dos critérios diagnósticos de infecção para a vigilância das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) em serviços de saúde permite a harmonização necessária para identificar o caso, coletar e interpretar as informações de modo sistematizado pelos profissionais e gestores do sistema de saúde. Nesse sentido, com o objetivo de padronizar em nível nacional os critérios epidemiológicos das IRAS, a Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde da Anvisa (GVIMS/GGTES/Dire3/Anvisa) publicou em 2010 o Manual: Critérios Diagnósticos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Para a elaboração desse manual, foram formados grupos técnicos (GT) com especialistas de notório saber de todo o país. Os GTs também foram responsáveis pelas revisões do referido manual nos anos de 2016, 2019 e 2021/2024.

Foram utilizados como base para a elaboração dos critérios diagnósticos epidemiológicos nacionais das IRAS, os critérios internacionais adaptados à realidade do Brasil, considerando critérios clínicos e laboratoriais.

Idealmente, os critérios diagnósticos epidemiológicos e clínicos devem ser semelhantes, no entanto, existem situações nas quais isso não ocorre. Em algumas situações, mesmo com o diagnóstico de infecção e o tratamento estabelecidos pelo médico do paciente, o critério diagnóstico epidemiológico para IRAS não é atendido conforme a definição nacional. O contrário também é possível. Dessa forma, considerando esse racional, destacamos que para fins de vigilância e notificação, só deverá ser considerada a existência da IRAS se as informações obtidas sobre o caso atenderem aos critérios diagnósticos aqui descritos, a fim de que possam ser comparáveis entre os diversos serviços para o Sistema Nacional.

Com objetivo de melhorar o entendimento e aplicabilidade dos critérios diagnósticos das IRAS, bem como reduzir a subjetividade na definição das IRAS e padronizar os conceitos utilizados em sua vigilância, no capítulo 1 apresentaremos as definições relevantes e exemplos de algumas situações práticas. Destaca-se que os conceitos

contidos no capítulo 1 não se aplicam às infecções de sítio cirúrgico.

### **IMPORTANTE**

Os critérios diagnósticos devem ser utilizados somente para a definição das IRAS sob o ponto de vista epidemiológico e não devem ser confundidos com os critérios clínicos, que são utilizados para a definição da infecção e do seu tratamento pelo médico do paciente.

O ideal é que durante a busca ativa e visita aos setores, os profissionais do Serviço/Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH/CCIH), responsáveis pela vigilância das IRAS, discutam com a equipe assistencial os casos de infecção diagnosticados pelo médico, bem como os casos suspeitos, para que ocorra a coleta do máximo de informações que possam contribuir para a conclusão e o fechamento do caso.

Dessa forma, a definição do tipo de infecção e o seu sítio, para fins de vigilância e notificação, deve ser discutida e concluída de forma conjunta pelos profissionais responsáveis pelas ações de prevenção e controle de infecção do serviço de saúde que tem a competência para realizar a vigilância das IRAS, conforme os critérios diagnósticos definidos pela Anvisa.

Nos capítulos 2 e 3, serão apresentados os critérios diagnósticos revisados das IRAS de notificação nacional obrigatória, como as que ocorrem nas unidades de terapia intensiva (UTIs): infecção de corrente sanguínea (IPCS) associada a cateter central, pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e infecção do trato urinário (ITU) associada a cateter vesical de demora, e as infecções de sítio cirúrgico.

**Importante:** Esses critérios devem ser adotados pelos profissionais responsáveis pela vigilância, monitoramento e notificação das IRAS de notificação nacional obrigatória em todos os serviços de saúde, no ano de 2025.

**Observação:** Os critérios diagnósticos de outras infecções, que não são de notificação nacional obrigatória, mas que são importantes de serem vigiadas e monitoradas dentro dos serviços de saúde, bem como algumas especificidades das IRAS de notificação obrigatória, podem ser consultados nos Manuais de Critérios Diagnósticos de IRAS, publicados pela Anvisa.

## 2. Conceitos, orientações gerais e exemplos para a aplicação dos critérios diagnósticos

Nesse tópico serão apresentadas as definições relevantes para aplicação dos critérios diagnósticos de IRAS, bem como os exemplos práticos para melhor caracterização e entendimento dessas definições. Destaca-se que os conceitos desse capítulo não se aplicam aos critérios diagnósticos das infecções de sítio cirúrgico.

### a. Período de janela da infecção

Período de sete dias durante os quais são identificados todos os elementos (sinais, sintomas, resultados de exames de imagens ou laboratoriais) necessários para atender ao critério diagnóstico de uma IRAS específica, definido pela Anvisa. A definição do período de janela é necessária para a definição da data da infecção.

Para a identificação do período de janela da infecção deve-se considerar **3 (três) dias antes e 3 (três) dias depois** da data da coleta do primeiro exame laboratorial com resultado positivo ou da realização do primeiro exame de imagem com resultado positivo/alterado ou, ainda, na ausência de exames, a data do primeiro sinal ou sintoma específico presente no critério diagnóstico daquela IRAS.

Quadro 1 – Período de janela da infecção.

<b>Período de janela da infecção (período composto por 7 dias)</b>		03 dias antes
	<b>Data da realização do primeiro exame laboratorial ou de imagem com resultado positivo/alterado</b>	
	<b>OU</b>	
	<b>Na ausência de exames laboratoriais ou de imagem, data do primeiro sinal ou sintoma específico do critério daquela IRAS.</b>	
		03 dias após

**Observação:** se os sinais e sintomas definidos no critério diagnóstico de uma infecção específica não estiverem dentro do período de janela da infecção (sombreado verde), não atenderá ao critério e, portanto, não será considerada como uma infecção específica do ponto de vista epidemiológico. Salientamos que, mesmo que o médico do paciente tenha certeza de que é uma infecção específica do ponto de vista clínico, do ponto de vista epidemiológico não se deve computar essa infecção e nem notificar ao Sistema nacional (Anvisa).

## b. Data da infecção

É a data em que ocorreu o primeiro elemento (sinal, sintoma ou realização de exames de imagens ou laboratoriais com resultado positivo/alterado) necessário para a definição da infecção, dentro do período de janela da infecção.

A determinação adequada da data da infecção é fundamental para definir:

- Se a infecção estava presente na admissão ou estava presente na internação, ou se é relacionada a assistência à saúde (IRAS)
- Se a infecção é associada ou não ao dispositivo invasivo
- O local de atribuição da infecção
- O primeiro dia da contagem do prazo para infecção de repetição

Quadro 2 – Exemplo de período de janela e data da infecção.

Data	Período de janela da infecção
04/01	
05/01	
06/01	
07/01	
<b>08/01</b>	<b>Data da realização do exame laboratorial positivo</b>
09/01	Sintoma
10/01	
11/01	Sinal
12/01	
13/01	
14/01	
<b>Data da infecção: 08/01</b>	

Quadro 3 – Exemplo de período de janela e data da infecção.

<b>Dia</b>	<b>Período de janela da infecção</b>
05/01	
06/01	
07/01	Sintoma X
08/01	
<b>09/01</b>	<b>Data da realização do exame de imagem positivo</b>
10/01	Data da realização do exame laboratorial positivo
11/01	
12/01	Sintoma Y
13/01	
14/01	
<b>Data da infecção: 07/01</b>	

**Observação:** Nesse exemplo o primeiro elemento necessário para definição da infecção foi o sintoma X que ocorreu no dia 07/01, portanto a data da infecção será nesse dia.

### c. Infecção presente na admissão

Uma infecção é considerada presente na admissão se a data da infecção ocorrer até o segundo dia de internação.

Quadro 4 – Exemplo para definir período para infecção presente na admissão

<b>Data</b>	<b>Dia de internação</b>	<b>Período de janela de infecção/ Elementos de um critério</b>
05/01	D1	
06/01	D2	Febre (38.6°C)
07/01	D3	
08/01	D4	<b>Cultura de urina:</b> <b><i>E. coli</i> &gt;10<sup>5</sup> CFU/ mL</b>
09/01	D5	
10/01	D6	
11/01	D7	
12/01	D8	
13/01	D9	
14/01	D10	
15/01	D11	

**Neste caso deve ser considerado:** Infecção presente na admissão

**Data da infecção:** 06/01

**Microrganismo:** *E. coli*

**Observação:** destaca-se que a data da infecção é a data em que o primeiro elemento usado para atender ao critério de infecção ocorre pela primeira vez no período de janela de infecção.

Quadro 5 – Exemplo de data da infecção (infecção presente na admissão e IRAS)


<b>Dia de internação</b>	<b>Data da infecção</b>	<b>Classificação da infecção, de acordo com a data da infecção</b>
D1	05/01	Infecção presente na admissão
D2	06/01	Infecção presente na admissão
D3	07/01	IRAS
D4	08/01	IRAS
D5	09/01	IRAS
D6	10/01	IRAS

**Observação:** apesar de não constar o período de janela da infecção neste exemplo, é importante levar em conta que a data da infecção é a data em que o primeiro elemento usado para atender ao critério de infecção ocorre pela primeira vez no período de janela da infecção.

#### **d. IRAS associada ao uso de dispositivos invasivos**

Para ser considerada uma IRAS associada a dispositivo invasivo, o paciente deve ter utilizado o dispositivo invasivo por um período maior que 2 (dois) dias consecutivos, considerando o D1 como o dia da instalação do dispositivo invasivo. Além disso, na data da infecção, o paciente deve estar em uso do dispositivo OU este deve ter sido removido no dia anterior.

As IRAS associadas a dispositivos invasivos que são de notificação obrigatória ao Sistema nacional são: infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) associada a cateter central, pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) e infecção do trato urinário (ITU) associada a cateter vesical de demora. Por esse motivo, no diagnóstico dessas infecções, foi incluído como um dos critérios a presença do dispositivo invasivo, conforme definido acima.



Fonte: GVIMS/GGTES/Dire3/Anvisa

### **Observações:**

1 – Se o dispositivo invasivo for retirado e for inserido um novo dispositivo no mesmo dia ou no dia seguinte, a contagem de tempo de uso do dispositivo invasivo segue normalmente, portanto, **não** se inicia uma nova contagem. No entanto, se o dispositivo invasivo for removido e **não** for inserido um novo dispositivo no mesmo dia ou no dia seguinte (ou seja, se ficar um dia inteiro sem uso do dispositivo), a contagem de uso do dispositivo será interrompida. Dessa forma, se após um dia da retirada do dispositivo for inserido um novo dispositivo, deve-se iniciar uma nova contagem.

2 – No caso de cateter totalmente implantado, considerar a contagem a partir do primeiro acesso/punção/ativação do dispositivo na internação (neste caso, considerar como D1 o dia de acesso/punção/ativação do dispositivo). Portanto, a infecção será associada a esse dispositivo a partir do D3 e continuará sendo associada a esse dispositivo (mesmo se não houver mais a punção/acesso/ativação do cateter) até a alta do paciente ou após o primeiro dia de retirada do cateter. Esse cateter também será considerado para a contagem do denominador (cateter-dia), desde o seu primeiro

acesso/punção/ativação até a sua remoção ou alta do paciente. Se ocorrer uma infecção após a implantação do cateter totalmente implantado e antes do seu primeiro acesso/punção/ativação, será considerada uma infecção de sítio cirúrgico (ISC), de acordo com o critério diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico.

3 – Se um paciente for internado com um dispositivo invasivo já instalado, o primeiro dia de internação será considerado o primeiro dia da contagem de dias do dispositivo invasivo (Dia 1).

Quadro 6 – Exemplo de como definir as IRAS associadas ao uso de dispositivo invasivo

<b>Data da infecção</b>	<b>Uso do dispositivo invasivo</b>	<b>Infecção associada ou não ao dispositivo invasivo</b>
05/01	Paciente sem dispositivo	Não associada
06/01	D1 - instalação do dispositivo invasivo	Não associada
07/01	D2	Não associada
<b>08/01</b>	<b>D3</b>	<b>Associada</b>
<b>09/01</b>	<b>D4</b>	<b>Associada</b>
<b>10/01</b>	<b>D5</b>	<b>Associada</b>
<b>11/01</b>	<b>D6</b>	<b>Associada</b>
<b>12/01</b>	<b>D7</b>	<b>Associada</b>
<b>13/01</b>	<b>D8 - retirada do dispositivo invasivo</b>	<b>Associada</b>
<b>14/01</b>	<b>Paciente sem dispositivo</b>	<b>Associada</b>
15/01	Paciente sem dispositivo	Não associada

Quadro 7 – Como definir IRAS associada ao uso de dispositivo invasivo quando o dispositivo for removido e instalado um novo dispositivo. Exemplo de IPCSL associada a cateter central:

<b>Data da infecção</b>	<b>Uso do dispositivo invasivo</b>	<b>Infecção associada ou não ao dispositivo invasivo</b>
05/01	Paciente sem dispositivo	Não associada
06/01	D1 - instalação do dispositivo invasivo (cateter central)	Não associada
07/01	D2	Não associada
<b>08/01</b>	<b>D3</b>	<b>Associada</b>
<b>09/01</b>	<b>D4</b>	<b>Associada</b>
<b>10/01</b>	<b>D5 – retirada do dispositivo invasivo (cateter central)*</b>	<b>Associada</b>
<b>11/01</b>	<b>D6 – instalado novo dispositivo no paciente (PICC)*</b>	<b>Associada</b>
<b>12/01</b>	<b>D7</b>	<b>Associada</b>
<b>13/01</b>	<b>D8 - retirada do dispositivo invasivo (PICC)</b>	<b>Associada</b>
<b>14/01</b>	<b>Paciente sem dispositivo</b>	<b>Associada</b>
15/01	Paciente sem dispositivo	Não associada

\* Se o dispositivo for retirado em um dia e o novo dispositivo for inserido no dia seguinte, deve-se continuar a contagem como se fosse o mesmo dispositivo, não sendo necessário iniciar uma nova contagem.

Quadro 8 – Como definir IRAS associada ao uso de dispositivo invasivo quando este for removido e instalado novo dispositivo. Exemplo de PAV:

<b>Data da infecção</b>	<b>Uso do dispositivo invasivo</b>	<b>Infecção associada ou não ao dispositivo invasivo</b>
05/01	Paciente sem dispositivo	Não associada
06/01	D1 – Instalado o ventilador mecânico	Não associada
07/01	D2	Não associada
<b>08/01</b>	<b>D3</b>	<b>Associada</b>
<b>09/01</b>	<b>D4</b>	<b>Associada</b>
<b>10/01</b>	<b>D5 - retirada da ventilador mecânico</b>	<b>Associada</b>
<b>11/01</b>	<b>Paciente sem ventilador mecânico</b>	<b>Associada</b>
<b>12/01</b>	<b>D1 - instalado novamente ventilador mecânico – reinicia a contagem</b>	Não associada
<b>13/01</b>	<b>D2</b>	Não associada
<b>14/01</b>	<b>D3</b>	<b>Associada</b>
	<b>D4 - retirada do ventilador mecânico</b>	<b>Associada</b>
15/01	<b>Paciente sem dispositivo</b>	<b>Associada</b>
16/01	Paciente sem dispositivo	Não associada

\* Se o dispositivo for retirado em um dia e houver passado pelo menos um dia completo sem a instalação de um novo dispositivo, deve-se suspender a contagem e iniciar uma nova contagem após instalar o novo dispositivo.

Quadro 9 – Como definir IRAS associada ao uso de dispositivo invasivo quando este for removido e instalado novo dispositivo. Exemplo de IPCS-ACC:

<b>Data da infecção</b>	<b>Uso do dispositivo invasivo</b>	<b>Infecção associada ou não ao dispositivo invasivo</b>
05/01	Paciente sem dispositivo	Não associada
06/01	D1 – Instalado cateter central	Não associada
07/01	D2	Não associada
<b>08/01</b>	<b>D3</b>	<b>Associada</b>
<b>09/01</b>	<b>D4</b>	<b>Associada</b>
<b>10/01</b>	<b>D5 – retirada do cateter central</b>	<b>Associada</b>
<b>11/01</b>	<b>Paciente sem cateter central</b>	<b>Associada</b>
<b>12/01</b>	<b>D1 - instalado novamente o cateter central – reinicia a contagem</b>	Não associada
<b>13/01</b>	<b>D2</b>	Não associada
<b>14/01</b>	<b>D3</b>	<b>Associada</b>
	<b>D4 - retirada do cateter central</b>	<b>Associada</b>
<b>15/01</b>	<b>D5 - instalado novamente o cateter central – não reinicia a contagem</b>	<b>Associada</b>
<b>16/01</b>	<b>D6</b>	<b>Associada</b>
<b>17/01</b>	<b>D7</b>	<b>Associada</b>
<b>18/01</b>	<b>D8</b>	<b>Associada</b>
<b>19/01</b>	<b>D9 – retirada do cateter central</b>	<b>Associada</b>
<b>20/01</b>	<b>Paciente sem cateter central</b>	<b>Associada</b>
21/01	Paciente sem cateter central	Não associada
21/01	Paciente sem cateter central	Não associada

\* Se o dispositivo for retirado em um dia e houver passado pelo menos um dia completo sem a instalação de um novo dispositivo, deve-se suspender a contagem e iniciar uma nova contagem após instalar o novo dispositivo.

Quadro 10 – Como definir IRAS associada ao uso de dispositivo invasivo. Exemplo de IRAS de um paciente internado há mais de 3 dias em uso de cateter totalmente implantável:

<b>Data da IRAS</b>	<b>Paciente com cateter central totalmente implantável</b>	<b>IRAS associada a dispositivo invasivo</b>
31/03	Cateter central totalmente implantado <b>não</b> puncionado/ativado	Não associada
01/04	Cateter central totalmente implantado <b>não</b> puncionado/ativado	Não associada
02/04	D1 – Realizado punção/ativação do cateter central totalmente implantado	Não associada
03/04	D2 - Cateter central totalmente implantado puncionado/ativado	Não associada
04/04	D3 - Cateter central totalmente implantado puncionado/ativado	<b>Associada</b>
05/04	D4 - Cateter central totalmente implantado puncionado/ativado	<b>Associada</b>
06/04	D5 - Cateter central totalmente implantado puncionado/ativado	<b>Associada</b>
07/04	D6 – Removido a punção/desativação do cateter central totalmente implantado	<b>Associada</b>
08/04	Cateter central totalmente implantado não puncionado/ativado	<b>Associada</b>
09/04	Cateter central totalmente implantado não puncionado/ativado	<b>Associada</b>
...		<b>Associada</b>
Alta do paciente	Cateter central totalmente implantado não puncionado/ativado	<b>Associada</b>

O cateter totalmente implantável, uma vez puncionado, deverá ser considerado elegível para IPCS associada a cateter central até a alta do paciente, mesmo que não esteja mais puncionado, ou até o dia seguinte a sua retirada completa.

Quadro 11 – Paciente internado com um dispositivo invasivo já instalado. Exemplo de ITU associada a cateter vesical de demora:

Data da infecção	Paciente cateter central	IRAS associada a dispositivo invasivo?
02/04 – <b>paciente internado, vindo do domicílio, em uso de cateter vesical de demora há vários dias</b>	D1 – Cateter vesical de demora	Não é uma IRAS
03/04	D2 - Cateter vesical de demora	Não é uma IRAS
04/04	D3 - Cateter vesical de demora	Sim
05/04	D4 - Cateter vesical de demora	Sim
06/04	D5 - Cateter vesical de demora	Sim
07/04	D6 – retirado Cateter vesical de demora	Sim
08/04	Sem cateter vesical de demora	Sim
09/04	Sem cateter vesical de demora	É uma IRAS, mas não associada a Cateter vesical de demora

#### e. Unidade/Serviço de atribuição da infecção

A infecção será atribuída à unidade/serviço no qual o paciente está internado na data do evento. Em casos de transferência ou admissão, a infecção será atribuída ao local de origem do paciente se a infecção ocorrer no dia da transferência/admissão (D1) ou no dia seguinte (D2) à transferência/admissão. A partir do D3, esse evento deve ser atribuído à unidade/serviço de destino.

Quadro 12 - Exemplo de paciente com IRAS transferido da UTI pediátrica para uma unidade de internação.

Data da infecção	Tempo desde a transferência	Atribuição da infecção à UTI Pediátrica	Atribuição da infecção à Unidade de Internação
05/03	D1 – Transferência do paciente	X	
06/03	D2	X	
07/03	D3		X
08/03	D4		X

09/03	D5		X
10/03	...		X

**Observação:** Paciente internado em uma unidade/serviço e submetido à hemodiálise deve ser incluído na vigilância para IPCSL da unidade em que estiver internado, mesmo que tenha apenas um cateter central e a equipe de diálise seja a única a acessá-lo. Por exemplo, um caso de IPCSL será atribuído à uma UTI quando:

- Paciente realiza hemodiálise na UTI e o procedimento é realizado pela equipe assistencial da unidade.
- Paciente realiza hemodiálise na UTI e o procedimento é realizado pela equipe externa especializada.
- Paciente está internado na UTI, mas é deslocado para a realização da hemodiálise na unidade ambulatorial. Como este paciente não pode ser contado no denominador da unidade ambulatorial, o evento deve ser atribuído à unidade no qual o paciente está internado.

#### f. Prazo para infecções de repetição (PIR)

É o período de 14 dias a contar da identificação de uma IRAS (a data da infecção é o D1 do Prazo para Infecções de Repetição - PIR), no qual nenhuma nova infecção do mesmo tipo (sítio ou topografia) deve ser computada, independentemente da identificação, nesse período, de outros microrganismos.

Se houver a identificação, nesse período de 14 dias, de outro microrganismo na mesma topografia/sítio, deve ser registrado um único evento de infecção, mas com dois microrganismos diferentes. A nomenclatura da infecção também não muda.

**O PIR se aplica apenas para a mesma internação, portanto, caso o paciente tenha alta e retorne ao hospital, um novo prazo deverá ser iniciado.**

**Exemplo (quadro 13):** Definido critério diagnóstico para IPCSL associada a cateter central causada por *Estafilococos* coagulase-negativo. Após 16 dias da data dessa infecção, o paciente permaneceu com cateter central e teve febre > 38°C, sendo coletada nova hemocultura no dia seguinte que identificou *Acinetobacter baumannii* e nenhum outro foco infeccioso. Nesse caso, deve ser considerada uma nova infecção, pois há um intervalo maior de 14 dias entre os dois eventos (contando a partir da data da primeira infecção até a data da segunda infecção).

Quadro 13 - Exemplo de prazo para infecção de repetição

Data	Cateter central	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição
30/12	Paciente mais de 2 dias internado e sem dispositivo		
31/12	Paciente sem dispositivo		
01/01	Paciente sem dispositivo		
02/01	D1 - instalação do dispositivo invasivo		
03/01	D2		
04/01	D3		
05/01	D4	Febre > 38°C	Início da contagem do PIR 1
06/01	D5	<b>Hemocultura positiva para Estafilococos coagulase-negativo</b>	2
07/01	D6	Hemocultura positiva para Estafilococos coagulase-negativo	3
08/01	D7		4
09/01	D8		5
10/01	D9		6
11/01	D10		7
12/01	D11		8
13/01	D12		9
14/01	D13		10
15/01	D14		11
16/01	D15		12
17/01	D16		13
18/01	D17		14
19/01	D18		

20/01	D19	Febre > 38°C	
21/01	D 20	Hemocultura positiva para <i>Acinetobacter baumannii</i>	
22/01	D 21		
23/01	D 22		
24/01	D22		

**Neste caso deve ser considerado:** DUAS infecções de corrente sanguínea associadas a cateter central. O início da contagem do PIR é na data da infecção 1.

- **Data da infecção 1 (IPCSL causada por microrganismo contaminante de pele): 05/01**

**P** Microrganismo causador da infecção 1: Estafilococos coagulase-negativo  
**Atenção:** Como esse é um microrganismo comensal (contaminante de pele), para atender ao critério de IPCSL, é necessário a presença de pelo menos um sinal ou sintoma e que este microrganismo seja identificado em duas hemoculturas cujas amostras foram coletadas no mesmo dia ou em dias consecutivos.

- **Data da infecção 2 (IPCSL causada por microrganismo patogênico): 20/01**

**P** Microrganismo causador da infecção 2: *Acinetobacter baumannii*  
**Atenção:** Como esse é um microrganismo patogênico, para atender ao critério de IPCSL, não é necessária a presença de nenhum sinal ou sintoma, apenas uma hemocultura positiva.

**Exemplo (Quadro 14):** Identificada, conforme critério diagnóstico da Anvisa, uma IPCSL não associada a cateter central, causada por Estafilococos coagulase-negativo no dia 05/01. No 10º dia da data desta infecção, o paciente, que estava no 4º dia (D4) de cateter central, teve febre >38°C, sendo coletada nova hemocultura no dia seguinte que identificou *Acinetobacter baumannii*. Neste caso, não se considera uma nova IPCSL, mas a mesma infecção, e o *Acinetobacter baumannii* identificado deverá ser adicionado à IPCSL do dia 05/01. Mesmo o paciente estando em uso de cateter central, essa infecção se manterá não associada ao cateter.

Quadro 14 - Exemplo de prazo para infecção de repetição

Data	Cateter central	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição
01/01	Paciente sem dispositivo		
02/01	Paciente sem dispositivo		
03/01	Paciente sem dispositivo		
04/01	Paciente sem dispositivo		
05/01	Paciente sem dispositivo	Febre > 38°C	Início da contagem do PIR 1
06/01	Paciente sem dispositivo	<b>Hemocultura positiva para Estafilococos coagulase-negativo</b>	2
07/01	Paciente sem dispositivo	Hemocultura positiva para Estafilococos coagulase-negativo	3
08/01	Paciente sem dispositivo		4
09/01	Paciente sem dispositivo		5
10/01	D1 - instalação do dispositivo invasivo		6
11/01	D2		7
12/01	D3		8
13/01	D4		9
14/01	D5	Febre > 38,6°C	10
15/01	D6	Hemocultura positiva para <i>Acinetobacter baumannii</i>	11
16/01	D7		12
17/01	D8		13
18/01	D9		14
19/01	D10		
20/01	....		

**Neste caso deve ser considerada apenas uma IPCSL não associada a cateter central. Data da infecção (IPCSL causada por microrganismo contaminante de pele e por microrganismo patogênico): 05/01**

Microrganismos causadores da infecção: Estafilococos coagulase-negativo e *Acinetobacter baumannii*

**Exemplo (Quadro 15):** Atendido o critério diagnóstico para IPCSL associada a cateter central causada por *Estafilococos* coagulase-negativo. Após 10 dias da data dessa infecção paciente teve febre >38°C. Foram coletadas hemocultura e urocultura no dia seguinte, sendo que a urocultura foi positiva para *Escherichia coli* e a hemocultura negativa. Neste caso, deve ser considerada uma nova infecção ITU, pois apesar do intervalo ser menor que 14 dias entre os dois eventos (contando a partir da data da primeira infecção) não há uma relação da primeira infecção com a segunda, pois são infecções de sítios distintos, e, portanto, o período de infecção de repetição não se aplica nesse caso. Também não é uma infecção de corrente sanguínea secundária à ITU.

Quadro 15 – Exemplo de prazo para infecção de repetição

Data	Cateter central	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição
01/01	Paciente sem cateter central		
02/01	D1 - instalação do cateter central		
03/01	D2		
04/01	D3		
05/01	D4	Febre > 38°C	Início da contagem do PIR 1
06/01	D5	<b>Hemocultura positiva para <i>Estafilococos</i> coagulase-negativo</b>	2
07/01	D6	Hemocultura positiva para <i>Estafilococos</i> coagulase-negativo	3
08/01	D7		4
09/01	D8		5
10/01	D9		6
11/01	D10		7
12/01	D11		8
13/01	D12		9
14/01	D13	Febre > 38,3°C	10
15/01	D14	<b>Urocultura positiva para <i>E. coli</i></b>	11
16/01	D15		12

17/01	D16		13
18/01	D17		14
19/01	D18		
20/01	D19		

**Neste caso devem ser consideradas:** DUAS infecções: uma infecção de corrente sanguínea associada a cateter central e uma infecção do trato urinário (não é possível definir se é associada ou não a cateter vesical de demora, pois não há a informação sobre o uso desse dispositivo no exemplo).

- **Data da infecção 1 (IPCSL causada por agente contaminante de pele): 05/01**  
Microorganismo causador da infecção 1: Estafilococos coagulase-negativo
- **Data da infecção 2 (ITU): 14/01**  
Microorganismo causador da infecção 2: E. coli

**Exemplo (Quadro 16):** paciente com PAV, de acordo com o critério diagnóstico da Anvisa. Após 11 dias da data da infecção, teve aumento da secreção e seguiu com leucopenia, febre >38°C e exame de imagem com infiltrado. Neste caso, NÃO deve ser considerada uma nova PAV, pois não houve um intervalo maior de 14 dias entre a data da infecção e o início da suposta nova infecção.

Quadro 16– Exemplo de prazo para infecção de repetição

Data	Ventilador mecânico	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição
31/12	D1 - instalação do ventilador mecânico		
01/01	D2		
02/01	D3	Febre > 38°C	Início da contagem do PIR 1
03/01	D4	Surgimento de secreção purulenta	2
04/01	D5	<b>Exame de imagem alterado</b>	3
05/01	D6	Ausculta com roncosp	4
06/01	D7		5
07/01	D8		6
08/01	D9		7
09/01	D10		8
10/01	D11		9

11/01	D12		10
12/01	D13	Aumento da secreção	11
13/01	D14	Leucopenia (< 4000 cel/mm <sup>3</sup> )	12
14/01	D15	<b>Exame de imagem alterado</b>	13
13/01	D16		14
14/01	D17	Febre > 38°C	
15/01	D16		

**Neste caso deve ser considerado:** apenas uma PAV definida clinicamente

Data da infecção: 02/01

**Exemplo (Quadro 17):** Paciente com ITU associada a cateter vesical de demora no dia 02/01. Recebeu alta 5 dias após a data da infecção. No dia 10/01 precisou ser internado novamente e foi instalado um cateter vesical de demora. No dia 13/01 (D4 do cateter) iniciou com febre >38°C e no dia 15/01 colheu urocultura que identificou *Enterococcus faecalis*. Neste caso, mesmo que o intervalo entre as datas das infecções seja inferior a 14 dias, como houve a alta do paciente, interrompeu-se a contagem do PIR, e portanto devem ser consideradas duas infecções.

Quadro 17 – Exemplo de prazo para infecção de repetição

Data	Cateter vesical de demora	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição
31/12	D4– do cateter vesical de demora		
01/01	D5		
02/01	Retirado o cateter	Febre > 38°C	Início da contagem do PIR 1
03/01		<b>Urocultura com <i>E. coli</i></b>	2
04/01			3
05/01			4
06/01			5
07/01		Paciente recebe alta	6 – interrompe a contagem do PIR
08/01			
09/01			

10/01	Instalado cateter vesical de demora- D1	Paciente internado novamente	
11/01	D2		
12/01	D3		
13/01	D4	<b>Febre &gt;38°C</b>	Início da contagem do PIR 1
14/01	D5		2
15/01	D6	<b>Urocultura com <i>Enterococcus faecalis</i></b>	3
16/01	D7		4
17/01	D8		5
18/01	D9		
...			

Neste caso deve ser considerado duas ITUs associadas a cateter vesical de demora.

**Data da infecção (ITU) 1: 02/01**

**Data da infecção (ITU) 2: 13/01**

#### **g. Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS)**

É a presença de um ou mais microrganismos na corrente sanguínea, cuja origem não está relacionada a nenhum outro foco de infecção (foco primário), conforme definido nos critérios diagnósticos nacionais. Neste sentido, o foco primário é a própria corrente sanguínea e, por isso, a infecção é denominada de **infecção primária de corrente sanguínea**.

##### **1.1. Infecção primária de corrente sanguínea laboratorialmente confirmada (IPCSL) associada a cateter central**

Infecção primária da corrente sanguínea confirmada laboratorialmente em paciente em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (a partir do D3, sendo o dia da inserção considerado D1, independentemente do horário de inserção) e que, na data da infecção, o paciente estava em uso do dispositivo ou este havia sido removido no dia anterior.

## h. Cateter central

Dispositivo intravascular utilizado para infusão, coleta de amostra sanguínea ou monitoramento hemodinâmico, cuja terminação esteja posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso\*.

\*São considerados grandes vasos: aorta, artéria pulmonar, veias cavas, veias braquicefálicas, veias jugulares internas, veias subclávias, veias ilíacas externa e comum, veias femorais e, em recém-nascidos, todo o cateter umbilical venoso ou arterial.

### Observação:

1. Para fins de vigilância, o sítio de inserção do cateter central ou tipo de dispositivo não devem ser exclusivos para determinar se um dispositivo é considerado um cateter central ou não. O importante é a localização da terminação do cateter que deve estar posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso.

2. Caso haja migração de um cateter originalmente instalado em um grande vaso, o mesmo deve ser considerado como central até sua retirada, para fins de vigilância epidemiológica.

3. Um introdutor é um cateter intravascular e, dependendo da localização da sua extremidade distal (ponta) e de seu uso, pode ser considerado um cateter central.

4. Um cateter intravascular sem lúmen que termina no coração ou próximo a ele ou, ainda, em um grande vaso que não é usado para infusão, retirada de sangue ou monitoramento hemodinâmico não é considerado um cateter central para fins desse documento (por exemplo, fios de marca-passo sem lúmen).

Nota: existem alguns fios de marcapasso que têm lúmens, que podem ser considerados cateteres centrais. Nos casos em que se utilize fio de marcapasso com lúmen, este deve ser considerado na contagem de dispositivo-dia para fins de vigilância.

## Tipos de cateteres centrais para fins de vigilância epidemiológica:

### Cateter central permanente:

- A. Cateter tunelizado, incluindo o cateter tunelizado de hemodiálise
- B. Cateter totalmente implantável, incluindo ports.

**Cateter central temporário:** Cateter não tunelizado, cateter não implantável, incluindo cateter temporário para hemodiálise.

**Cateter central de inserção periférica (PICC):** dispositivo intravenoso, introduzido através de uma veia superficial ou profunda de um membro superior ou inferior até o terço distal da veia cava superior ou proximal da veia cava inferior.

**Cateter umbilical:** dispositivo vascular central inserido por meio da artéria ou veia umbilical em neonatos. Todos os cateteres umbilicais são considerados cateteres centrais.

### NÃO são considerados cateteres centrais para fins de notificação de dados de IPCSL:

- Fístula arteriovenosa
- Enxerto arteriovenoso
- Cateteres atriais (também conhecidos como cateteres intracardíacos transtorácicos, os cateteres inseridos diretamente no átrio direito ou esquerdo através da parede do coração)
- Suporte de vida extracorpóreo (ECMO)
- Enxerto para hemodiálise (HERO)
- Dispositivos de bomba de balão intra-aórtico (BIA)
- Cateter periférico ou cateter de linha média (midline)
- Dispositivo de assistência ventricular (VAD)
- Cateter arterial, que não se enquadra na definição de cateter central

## **i. Pneumonia**

É uma infecção pulmonar identificada pela utilização de uma combinação de critérios clínicos, laboratoriais e de imagem.

### **Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV)**

Pneumonia em paciente em uso de ventilação mecânica (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (sendo que o D1 é o dia de início da VM) e que, na data da infecção, o paciente estava em VM ou a VM havia sido removida no dia anterior.

### **Ventilador mecânico (VM)**

Dispositivo utilizado para auxiliar ou controlar a respiração de forma contínua, inclusive no período de desmame, por meio de traqueostomia ou intubação endotraqueal.

Dispositivos de ventilação e expansão pulmonar que fornecem pressão positiva para as vias aéreas por meios não invasivos (por exemplo: máscara nasal, máscara facial, cateter de alto fluxo CPAP, BIPAP etc.) não são considerados ventiladores mecânicos, a menos que a pressão positiva seja fornecida por via aérea artificial (tubo endotraqueal oral / nasal ou tubo de traqueostomia).

## **j. Infecção do trato urinário sintomática (ITU)**

É a presença de um ou mais microrganismos identificados em amostra de urina em pacientes com sinais ou sintomas.

### **ITU Associada à cateter vesical de demora (ITU-AC)**

É uma infecção do trato urinário em paciente com cateter vesical de demora instalado por um período maior que dois dias consecutivos (sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e, na data da infecção, o paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia anterior.

## Cateter vesical de demora (CVD)

É um tubo de drenagem inserido na bexiga através da uretra e que permanece instalado. O cateter vesical de demora é conectado a uma bolsa coletora. Cateteres urinários permanentes que são usados para irrigação intermitente ou contínua também deverão ser incluídos na vigilância.

Observação: Não são considerados como cateter vesical de demora: nefrostomia, cateteres suprapúbicos, dispositivo para incontinência urinária, cateter duplo J, cistostomia, punção supra púbica e cateter utilizado para cateterização vesical intermitente.

### 3. Critérios Diagnósticos das IRAS associadas a dispositivos invasivos de notificação obrigatória

#### 3.1 Critérios diagnósticos de infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central

##### Critérios diagnósticos de infecção primária de corrente sanguínea laboratorialmente confirmada (IPCSL) associada a cateter central em pacientes adultos e pediátricos

###### **Critério 1: IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo patogênico em adultos e crianças > 28 dias**

Paciente > 28 dias em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior.

###### **E**

Apresenta microrganismo patogênico bacteriano ou fúngico, não incluído na lista de microrganismos comensais<sup>1</sup>, isolado em amostra sanguínea<sup>2</sup>:

1. Identificado a partir de uma ou mais amostras de sangue obtidas em hemocultura

###### **OU**

Identificado gênero e espécie ou pelo menos o gênero, por métodos validados de teste microbiológico não baseado em cultura<sup>3</sup>

###### **E**

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso<sup>4</sup>

###### **Notas**

<sup>1</sup> A lista completa dos microrganismos contaminantes de pele (comensais) pode ser consultada no *link*: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/lista-de-comensais->

<sup>2</sup> A coleta de amostras de sangue deve ser feita preferencialmente em punção periférica, mas admite-se que a IPCSL causada por microrganismo patogênico seja definida

utilizando-se resultado de hemocultura ou de teste microbiológico não baseado em cultura de amostra coletada de cateter central, nos casos em que não é possível fazer coleta periférica.

<sup>3</sup>Os testes microbiológicos não baseados em cultura são testes moleculares, automatizados, realizados a partir de amostras de sangue. Estes testes podem utilizar, por exemplo, PCR multiplex, tecnologia de ressonância magnética miniaturizada ou sequenciamento de DNA de células microbianas para o diagnóstico microbiológico.

Vale reforçar que caso a hemocultura tenha sido coletada 2 dias antes ou 1 dia depois do teste microbiológico não baseado em cultura, devemos considerar o resultado da hemocultura (padrão ouro) para a vigilância de IPCSL e desconsiderar o resultado do teste microbiológico não baseado em cultura.

<sup>4</sup>Se o microrganismo estiver relacionado a outro foco infeccioso (conforme anexo 1 desse documento) essa infecção de corrente sanguínea não será primária, e portanto, não deve ser notificada como IPCSL.

## **Critério 2: IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo contaminante de pele em adultos e crianças > 1 ano**

Paciente > 1 ano em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior

### **E**

Apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

- Febre (>38°C)
- Calafrios
- Hipotensão (pressão sistólica  $\leq$  90 mmHg em adultos e, em crianças, ver parâmetros clínicos por faixa etária no anexo I do manual de Critérios Diagnósticos de IRAS)

### **E**

Apresenta microrganismos contaminantes de pele (comensais<sup>1a,1b</sup>), por exemplo: *Corynebacterium* spp. (exclui *C. diphtheriae*), *Bacillus* spp. (exclui *B. anthracis*), *Propionibacterium* spp., *Staphylococcus* coagulase negativo, *Streptococcus* do grupo

*viridans*, *Aerococcus* spp. e *Micrococcus* spp, identificados em DUAS ou mais hemoculturas, coletadas em momentos distintos, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte<sup>2,3</sup>.

**E**

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso<sup>4</sup>

**E**

Os sinais/sintomas e o resultado da hemocultura ocorreram no período de janela da Infecção.

**Critério 3: IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo contaminante de pele em crianças > 28 dias e ≤ 1 ano**

Paciente > 28 dias e ≤ 1 ano em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior

**E**

Paciente apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

- Febre (>38°C)
- Hipotermia (<35°C)
- Apnéia
- Bradicardia (ver parâmetros clínicos por faixa etária no anexo I do manual de Critérios Diagnóstico de IRAS)

**E**

Apresenta microrganismos contaminantes de pele (comensais<sup>1a,1b</sup>), por exemplo: *Corynebacterium* spp. (exclui *C. diphtheriae*), *Bacillus* spp. (exclui *B. anthracis*), *Propionibacterium* spp., *Staphylococcus coagulase negativo*, *Streptococcus* do grupo *viridans*, *Aerococcus* spp. e *Micrococcus* spp, identificados em DUAS ou mais

hemoculturas, coletadas em momentos distintos, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte<sup>2,3</sup>.

**E**

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso<sup>4</sup>

**E**

Os sinais/sintomas e o resultado da hemocultura ocorreram no período de Janela da Infecção.

### Notas (critério 2 e 3)

<sup>1a</sup>A lista completa dos microrganismos contaminantes de pele (comensais) pode ser consultada no link: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/lista-de-comensais-comuns.xlsx>

<sup>1b</sup>As duas amostras contaminantes de pele (comensais) correspondentes representam um único elemento para cumprimento do critério 2 ou 3 e a data de coleta da primeira amostra é usada para determinar a data da infecção.

<sup>2</sup> A frase “duas ou mais hemoculturas coletadas em momentos distintos” significa que:

Pelo menos duas coletas separadas de amostra de sangue foram realizadas no mesmo dia ou em dias consecutivos, com preparo (etapas de antissepsia de pele ou desinfecção do conector) individualizado de cada sítio/local de coleta durante a coleta.

O objetivo disso é garantir que seja feito um preparo/antissepsia do sítio/local de coleta para cada coleta realizada. Desta forma, reduz-se o risco de contaminação da coleta ser considerada IPCSL.


Por exemplo: Preparar de forma individualizada, ou seja, realizar as etapas de antissepsia/desinfecção de forma separada nas:

- duas coletas de sangue de diferentes sítios (diferentes punções venosas periféricas, a combinação de uma punção venosa e coleta de um lúmen do cateter central, ou coleta de dois lumens diferentes de um mesmo cateter central {cada lúmen deve ser preparado de forma individual antes da coleta, lembrando que esse tipo de coleta é admitido em caso de exceção quando não for possível fazer a coleta periférica}) OU
- duas coletas de sangue de um mesmo sítio (coletadas em diferentes horários)

<sup>3</sup>A coleta de amostras de sangue para hemoculturas deve ser feita preferencialmente em punção de veia periférica, pois amostras colhidas do cateter têm elevado risco de contaminação por microrganismos comensais e, portanto, maior chance de resultados falso-positivos. Por isso, hemoculturas positivas coletadas apenas de cateter central, devem ser evitadas. No entanto, em situações de exceção, admite-se que a IPCSL causada por agente contaminante de pele seja definida utilizando-se duas hemoculturas positivas coletadas de cateter central, nos casos em que não é possível fazer coleta periférica. Reforça-se a necessidade de preparo adequado do local/sítio da coleta de sangue (vide detalhamento da coleta de hemocultura no anexo do capítulo de infecção de corrente sanguínea do Manual de Critérios diagnósticos de IRAS).

<sup>4</sup>Se o microrganismo estiver relacionado a outro foco infeccioso (conforme anexo 1 desse documento) essa infecção de corrente sanguínea não será primária, e portanto, não deve ser notificada como IPCSL.

Quadro 1. Fluxograma para notificação de IPCSL associada a cateter central em pacientes > 28 dias.



## Critérios diagnósticos de infecção primária de corrente sanguínea associada à cateter central em neonatologia

### **Critério 1: IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo patogênico em recém-nascidos ≤ 28 dias<sup>1</sup>**

Paciente ≤ 28 dias<sup>1</sup> em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior

**E**

Apresenta microrganismo patogênico bacteriano ou fúngico, não incluído na lista de microrganismos comensais<sup>2</sup>, isolado em amostra sanguínea<sup>3</sup>:

1. Identificado a partir de uma ou mais amostras de sangue obtidas em hemocultura

**OU**

2. Identificado gênero e espécie ou pelo menos o gênero, por métodos validados de teste microbiológico não baseado em cultura<sup>4</sup>

**E**

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso<sup>5</sup>.

### **Notas:**

<sup>1</sup> Ou maior que essa idade no caso dos pacientes que permanecerem na unidade neonatal, principalmente prematuros. Se o paciente possuir idade >28 dias, mas está internado na UTI neonatal, aplica-se o critério para recém-nascido. Adotar esse critério até a alta da unidade neonatal, mesmo que a UTI seja mista: neonatal e pediátrica.

<sup>2</sup>A lista completa dos microrganismos contaminantes de pele (comensais) pode ser consultada no *link*: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/llista-de-comensais-comuns.xlsx>

<sup>3</sup>A coleta de amostras de sangue deve ser feita, preferencialmente, em punção periférica, mas admite-se

que a IPCSL causada por microrganismo patogênico seja definida utilizando-se resultado de hemocultura ou de teste microbiológico não baseado em cultura de amostra coletada de cateter central, nos casos em que não é possível fazer coleta periférica.

<sup>4</sup>Os testes microbiológicos não baseados em cultura são testes moleculares, automatizados, realizados a partir de amostras de sangue. Estes testes podem utilizar, por exemplo, PCR multiplex, tecnologia de ressonância magnética miniaturizada ou sequenciamento de DNA de células microbianas para o diagnóstico microbiológico.

Vale reforçar que, caso a hemocultura tenha sido coletada 2 dias antes ou 1 dia depois do teste microbiológico não baseado em cultura, devemos considerar o resultado da hemocultura (padrão ouro) para a vigilância de IPCSL e desconsiderar o resultado do teste microbiológico não baseado em cultura.

Na suspeita de IPCS recomenda-se coletar hemocultura antes do início da antibiotecoterapia empírica.

<sup>5</sup>Se o microrganismo estiver relacionado a outro foco infeccioso (conforme anexo 1 desse documento) essa infecção de corrente sanguínea não será primária e, portanto, não deve ser notificada como IPCSL.

**Critério 2: IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo contaminante de pele em recém-nascidos ≤ 28 dias<sup>1</sup>**

Paciente  $\leq 28$  dias<sup>1</sup> em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior

**E**

Com pelo menos DOIS dos seguintes sinais e sintomas<sup>2</sup> sem outra causa não infecciosa reconhecida:

- Instabilidade térmica ( $T^a > 37,5^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ )
- Bradicardia
- Apneia
- Intolerância alimentar
- Piora do desconforto respiratório
- Intolerância à glicose
- Instabilidade hemodinâmica
- Hipoatividade/letargia

**E**

Pelo menos um dos seguintes:

- Apresenta microrganismos contaminantes de pele (comensais<sup>3</sup>): *Corynebacterium* spp. (exclui *C. diphtheriae*), *Bacillus* spp. (exclui *B. anthracis*), *Propionibacterium* spp., *Streptococcus* do grupo viridans, *Aerococcus* spp. e *Micrococcus* spp. Identificados em DUAS ou mais hemoculturas coletadas em momentos distintos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte<sup>4,5</sup>.
- Apresenta *Staphylococcus* coagulase negativo identificado em duas hemoculturas e pelo menos UMA hemocultura coletada por punção periférica, com positividade até 48 horas de incubação **E** pelo menos um dos seguintes:
  - Hemograma com  $\geq 3$  parâmetros alterados<sup>2</sup>
  - Proteína C Reativa quantitativa alterada

**E**

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso<sup>6</sup>

**E**

Os sinais/sintomas e exame de identificação do microrganismo ocorreram no Período de Janela da Infecção.

## Notas

<sup>1</sup> Ou maior que essa idade no caso dos pacientes que permanecerem na unidade neonatal, principalmente prematuros. Se o paciente possuir idade >28 dias, mas está internado na UTI neonatal, aplica-se o critério para recém-nascido. Adotar esse critério até a alta da unidade neonatal, mesmo que a UTI seja mista: neonatal e pediátrica.

<sup>2</sup> Parâmetros clínicos, escore hematológico e outros parâmetros laboratoriais vide anexos do Manual de Critérios Diagnóstico de Neonatologia.

<sup>3</sup> A lista completa dos microrganismos contaminantes de pele (comensais) pode ser consultada no [link: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/lista-de-comensais-comuns.xlsx](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/lista-de-comensais-comuns.xlsx)

<sup>4</sup> A frase “duas ou mais hemoculturas coletadas em momentos distintos” significa que:

Pelo menos duas coletas separadas de amostra de sangue foram realizadas no mesmo dia ou em dias consecutivos, com preparo (etapas de antissepsia de pele ou desinfecção do conector) individualizado de cada sítio/local de coleta durante a coleta.

O objetivo disso é garantir que seja feito um preparo/antissepsia do sítio/local de coleta para cada coleta realizada. Desta forma, reduz-se o risco de contaminação da coleta ser considerada IPCSL.

Por exemplo: Preparar de forma individualizada, ou seja, realizar as etapas de antissepsia/desinfecção de forma separada nas:

- duas coletas de sangue de diferentes sítios (diferentes punções venosas periféricas, a combinação de uma punção venosa e coleta de um lúmen do cateter central, ou coleta de dois lumens diferentes de um mesmo cateter central {cada lúmen deve ser preparado de forma individual antes da coleta, lembrando que esse tipo de coleta é admitido em caso de exceção quando não for possível fazer a coleta periférica}) OU
- duas coletas de sangue de um mesmo sítio (coletadas em diferentes horários)

<sup>5</sup> A coleta de amostras de sangue para hemoculturas deve ser feita preferencialmente em punção de veia periférica, pois amostras colhidas do cateter têm elevado risco de contaminação por microrganismos comensais e portanto, maior chance de resultados falso-positivos, por isso hemoculturas positivas coletadas apenas de cateter central, devem ser evitadas. No entanto, em situações de exceção, admite-se que a IPCSL seja definida utilizando-se hemoculturas positivas coletadas apenas de cateter central, nos casos em que não é possível fazer coleta periférica. Reforça-se a necessidade de preparo adequado do local/sítio da coleta de sangue (vide detalhamento da coleta de hemocultura no anexo do capítulo de infecção de corrente sanguínea do Manual de Critérios diagnósticos de IRAS).

Na suspeita de IPCS recomenda-se coletar hemocultura antes do início da antibiotecoterapia empírica.

<sup>6</sup> Se o microrganismo estiver relacionado a outro foco infeccioso (conforme anexo 1 desse documento) essa infecção de corrente sanguínea não será primária e, portanto, não deve ser notificada.

**Critério 3: infecção primária da corrente sanguínea clínica (IPCSC), sem confirmação laboratorial, associada a cateter central em recém-nascidos ≤ 28 dias<sup>1</sup>**

Paciente ≤ 28 dias<sup>1</sup> em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior.

**E**

Com pelo menos DOIS dos seguintes sinais e sintomas<sup>2</sup> sem outra causa não infecciosa reconhecida e sem relação com infecção em outro local:

- Instabilidade térmica ( $T^a > 37,5^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ )
- Apneia
- Bradicardia
- Intolerância alimentar
- Piora do desconforto respiratório
- Intolerância à glicose
- Instabilidade hemodinâmica
- Hipoatividade/letargia

**E**

Todos os seguintes critérios:

- Hemograma com  $\geq 3$  parâmetros alterados e/ou Proteína C Reativa quantitativa seriada alterada<sup>2</sup>
- Hemocultura não realizada, negativa ou considerada contaminação<sup>3</sup>
- Ausência de evidência de infecção em outro sítio
- Terapia antimicrobiana instituída e mantida pelo médico assistente

**E**

Os sinais/sintomas e os resultados laboratoriais ocorreram no Período de Janela de Infecção.

## Notas

<sup>1</sup>Ou maior que essa idade no caso dos pacientes que permanecerem na unidade neonatal, principalmente prematuros. Se o paciente possuir idade >28 dias, mas está internado na UTI neonatal, aplica-se o critério para recém-nascido. Adotar esse critério até a alta da unidade neonatal, mesmo que a UTI seja mista: neonatal e pediátrica.

<sup>2</sup>Parâmetros clínicos, escore hematológico e outros parâmetros laboratoriais vide anexos do manual de neonatologia.

<sup>3</sup>Hemocultura considerada contaminada por microrganismo contaminante de pele inclui aquelas em que o crescimento do microrganismo ocorreu em período maior que 48 horas de incubação. Ou, ainda, que o microrganismo contaminante de pele foi isolado em apenas uma hemocultura ou não atendeu os requisitos de coleta das amostras, conforme definido no critério diagnóstico de IPCSL causada por microrganismos contaminante de pele. A lista completa dos microrganismos contaminantes de pele (comensais) pode ser consultada no *link*:

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/lista-de-comensais-comuns.xlsx>

## Exemplos de IPCSL associada à cateter central

Quadro 18: Exemplo de IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo patogênico:

Data	Dia de instalação do cateter central	Período de janela da infecção
01/01	Paciente sem cateter central	
02/01	D1 - instalação do cateter central	
03/01	D2	
04/01	D3	
05/01	D4	
06/01	D5	
07/01	D6	<b>Hemocultura positiva ou teste microbiológico não baseado em cultura identificou <i>Acinetobacter baumannii</i></b>
08/01	D7	
09/01	D8	
10/01	D9	
11/01	D10	
12/01	D11	

- O microrganismo patogênico (bacteriano ou fúngico) identificado em hemocultura ou em teste microbiológico não baseado em cultura não estar relacionado a outro foco infeccioso, conforme descrito no anexo 1 deste documento. Como a data da infecção o paciente estava no D6 de cateter, essa infecção é associada à cateter central.
- Data da IPCSL associada à cateter central causada por microrganismo patogênico: 07/01
- Microrganismo identificado: *Acinetobacter baumannii*

Quadro 19 – Exemplo de IPCSL associada a cateter central causada por microrganismo contaminante de pele (considerando um paciente > 1 ano):

DATA	Dia de instalação do cateter central	Período de janela da infecção
03/01	D1 - instalação do cateter central	
04/01	D2	
05/01	D3	
06/01	D4	Febre > 38°C
07/01	D5	
08/01	D6	
09/01	D7	<b>Resultado do 1º teste diagnóstico: <i>S. epidermidis</i></b>
10/01	D8	Resultado da 2º teste diagnóstico: <i>S. epidermidis</i>
11/01	D9	
12/01	D10	

- O resultado do teste diagnóstico (hemocultura ou teste microbiológico não baseado em cultura) detectou o *S. epidermidis*. Do ponto de vista epidemiológico, como esse é um microrganismo comensal, para atender ao critério de IPCSL, é necessária a presença de pelo menos um sinal ou sintoma. Além disso, é necessário que este microrganismo seja identificado em duas hemoculturas coletadas no mesmo dia ou em dois dias consecutivos, dentro do período de janela de infecção. Ademais, o mesmo não deve estar relacionado a outro foco infeccioso. Como na data da infecção o paciente estava no D4 de cateter, essa infecção é associada à cateter central.
- Data da IPCSL associada à cateter causada por microrganismo patogênico: 06/01
- Microrganismo identificado: *S. epidermidis*

Quadro 20 – Exemplo de IPCSL associada a cateter central

<b>Data</b>	<b>Dia de instalação do cateter central</b>	<b>Período de janela da infecção</b>
05/01	Paciente mais de 3 dias internado e sem cateter central	
06/01	D1 - instalação do cateter central	
07/01	D2	
08/01	D3	
09/01	D4	
10/01	D5	
11/01	D6	
12/01	D7	
13/01	D8 - retirada do cateter central	
14/01	Um dia após a retirada do cateter central	Hemocultura positiva - Microorganismo NÃO contaminante de pele (patogênico)
15/01	Paciente sem cateter central	
16/01	Paciente sem cateter central	
17/01	Paciente sem cateter central	

- Paciente estava usando cateter por um período maior que dois dias de calendário e na data da infecção havia removido o cateter no dia anterior. Ou seja, a data da infecção foi um dia após a retirada do cateter central. Como o microrganismo identificado é patogênico, então, não há necessidade de nenhum sinal ou sintoma, conforme critério diagnóstico 1 de IPCSL. Neste caso, para fins de vigilância epidemiológica e notificação, de acordo com o esse critério tem-se uma IPCSL associada a cateter central.
- Data da IPCSL causada por microrganismos patogênico: **14/01**.

Quadro 21 – Exemplo de IPCSL não associada a cateter central

Data	Dia de instalação do cateter central	Período de janela da infecção
05/01	Paciente com mais de 3 dias internado e sem cateter central	
06/01	D1 - instalação do cateter central	
07/01	D2	
08/01	D3	
09/01	D4	
10/01	D5	
11/01	D6	
12/01	D7	
13/01	D8 - retirada do cateter central	
14/01	Um dia após a retirada do cateter central	
15/01	Paciente sem cateter central	<b>Hemocultura positiva - Microorganismo NÃO contaminante de pele</b>
16/01		
17/01		
18/01		
19/01	...	

- Como o paciente na data da hemocultura, que é a data da infecção, conforme mostrado no quadro, havia removido o cateter há dois dias, para fins de vigilância e notificação, essa infecção **NÃO DEVE** ser considerada uma IPCSL associada à cateter central.

Quadro 22 – Exemplo de IPCSL associada a cateter central

<b>Data</b>	<b>Dia de instalação do cateter central</b>	<b>Janela de infecção</b>
05/01	Paciente mais de 3 dias internado e sem <b>cateter central</b>	
06/01	D1 - instalação do cateter central	Febre
07/01	D2	
08/01	<b>D3</b>	
09/01	<b>D4</b>	<b>Primeira hemocultura positiva - Microrganismo contaminante de pele</b>
10/01	<b>D5</b>	
11/01	<b>D6</b>	
12/01	<b>D7</b>	Segunda hemocultura positiva - Microrganismo contaminante de pele
13/01	<b>D8 - retirada do cateter central</b>	
14/01	<b>Um dia após a retirada do cateter central</b>	
15/01		

- Para fins de vigilância epidemiológica e notificação, essa infecção **NÃO DEVE** ser considerada IPCSL associada à cateter central, pelos seguintes motivos: apesar do paciente ter tido um sintoma, no dia 06/01, este foi o dia da instalação do cateter (D1). Então, não poderia ser a data da infecção, pois o paciente teria que estar a pelo menos dois dias em uso do cateter, ou seja, pelo menos no D3.

- Além disso, apesar de todos os elementos que preenchem os critérios estarem dentro do período de janela, de acordo com o critério diagnóstico 2 de IPCSL, as hemoculturas positivas para microrganismos contaminantes de pele deveriam ter sido colhidas no mesmo dia ou a segunda hemocultura deveria ter sido colhida, no máximo, no dia seguinte após coleta da primeira. Neste caso, a segunda hemocultura com o microrganismo contaminante de pele somente foi colhida 3 dias após a primeira amostra.

## 3.2 Critérios diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica

### Critérios diagnósticos de PAV em adultos e crianças

#### Critério 1: PAV Definida Clinicamente em adultos e crianças > 1 ano

Paciente >1 ano em uso de ventilador mecânico (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do VM) e que, na data da infecção, o paciente estava em uso de VM ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

**E**

SEM doença cardíaca ou pulmonar de base<sup>1</sup> com UM ou mais exames de imagem<sup>2</sup> seriados com um dos seguintes achados, sendo eles, novo ou persistente ou progressivo:

- Infiltrado
- Opacificação/consolidação
- Cavitação
- pneumatocele

**E**

Pelo menos UM dos sinais e sintomas:

- Febre (temperatura: >38°C).
- Leucopenia (< 4000 cel/mm<sup>3</sup>) ou leucocitose (> 12000 cel/mm<sup>3</sup> ou ≥ 15000 cel/mm<sup>3</sup> e desvio a esquerda com mais de 10% de formas jovens de neutrófilos em crianças ≤ 14 anos.
- Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes ≥70 anos.

**E**

Pelo menos DOIS dos sinais e sintomas:

- surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção<sup>3</sup> ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração.
- Apneia ou taquipneia ou dispneia ou tosse (episódio novo ou com agravamento).
- Ausculta com sibilos, roncos ou estertores (episódio novo ou com agravamento).
- Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, por pelo menos 2 dias.

**E**

Os sinais/sintomas e exames de imagem ocorreram no Período de Janela de Infecção.

## **Critério 2: PAV Definida Clinicamente em crianças > 28 dias e ≤ 1 Ano**

Paciente > 28 dias e ≤ 1 Ano em uso de ventilador mecânico (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do VM) e que na data da infecção o paciente estava em uso de VM ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

### **E**

SEM doença cardíaca ou pulmonar de base<sup>1</sup> com UM ou mais exames de imagem<sup>2</sup> seriados com um dos seguintes achados, sendo eles, novo ou persistente ou progressivo:

- Infiltrado
- Opacificação/ Consolidação
- Cavitação
- Pneumatocele

### **E**

Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, por pelo menos 2 dias.

### **E**

Pelo menos TRÊS dos seguintes sinais e sintomas:

- Febre (temperatura: > 38°C) ou Hipotermia (temperatura: < 36°C).
- Leucopenia ( $\leq 4000$  cel/mm<sup>3</sup>) ou leucocitose ( $\geq 15000$  cel/mm<sup>3</sup>) e desvio a esquerda ( $\geq 10\%$  bastonetes).
- Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção<sup>3</sup> ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração.
- Apnéia ou taquipneia, batimento de asa de nariz e tiragem intercostal (episódio novo ou com agravamento).
- Ausculta com sibilos, roncosp ou estertores (episódio novo ou com agravamento).
- Tosse (episódio novo ou com agravamento).
- Bradicardia (< 100bpm) ou taquicardia (> 170bpm).

### **E**

Os sinais/sintomas e exames de imagens ocorreram no Período de Janela da Infecção

### **Critério 3: PAV Definida Microbiologicamente em adultos e crianças > 28 dias**

Paciente > 28 dias em uso de ventilador mecânico (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do VM) e que na data da infecção o paciente estava em uso de VM ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

#### **E**

SEM doença cardíaca ou pulmonar de base<sup>1</sup> com UM ou mais exames de imagem<sup>2</sup> seriados com um dos seguintes achados, sendo eles, novo ou persistente ou progressivo:

- Infiltrado
- Opacificação/consolidação
- Cavitação
- Pneumatocele

#### **E**

Pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas:

- Febre (temperatura > 38°C) ou Hipotermia (temperatura: < 36°C) para crianças > 28 dias e ≤ 1 Ano.
- Leucopenia (< 4000 cel/mm<sup>3</sup>) ou leucocitose (> 12000 cel/mm<sup>3</sup> ou > 15000 cel/mm<sup>3</sup> e desvio a esquerda com mais de 10% de formas jovens de neutrófilos em crianças ≤ 14 anos).
- Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes ≥70 anos.

#### **E**

Pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas:

Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção<sup>3</sup> ou

aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração.

- Apneia ou taquipneia ou dispneia ou tosse (episódio novo ou com agravamento).
- Ausculta com sibilos, roncosp ou estertores (episódio novo ou com agravamento).
- Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, por pelo menos 2 dias.

## E

Pelo menos UM dos resultados abaixo:

- Hemocultura positiva<sup>4</sup>, sem outro foco de infecção.
- Cultura positiva do líquido pleural.
- Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por procedimento com mínimo potencial de contaminação (lavado broncoalveolar, escovado protegido e aspirado endotraqueal<sup>5</sup>)<sup>4</sup>.
- Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de  $\geq 5\%$  de leucócitos e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias intracelulares).
- Cultura positiva de tecido pulmonar.
- Exame histopatológico mostrando pelo menos uma das seguintes evidências de pneumonia:
  - Formação de abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos;
  - Evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-hifas.
- Vírus, *Bordetella*, *Legionella*, *Chlamydomphila* ou *Mycoplasma* identificados a partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou identificados por teste microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou tratamento.
- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para patógeno (exemplo: *Chlamydomphila*).
- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para *Legionella pneumophila* sorogrupo I titulada  $\geq 1:128$  na fase aguda e convalescença por imunofluorescência indireta.
- Detecção de antígeno de *Legionella pneumophila* sorogrupo I em urina.

## E

Os sinais/sintomas e os exames de imagens e laboratoriais ocorreram no Período de Janela de Infecção.

#### **Critério 4: PAV em Imunodeprimidos - adultos e crianças > 28 dias**

Paciente > 28 dias, imunodeprimido<sup>6</sup>, em uso de ventilador mecânico (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que oD1 é o dia da instalação do VM) e que na data da infecção o paciente estava em uso de VM ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

#### **E**

SEM doença cardíaca ou pulmonar de base<sup>1</sup> com UM ou mais exames de imagem<sup>2</sup> seriados com um dos seguintes achados, sendo eles, novo ou persistente ou progressivo:

- o Infiltrado
- o Opacificação/consolidação
- o Cavitação
- o Pneumatocele

#### **E**

Pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas:

- o Febre (temperatura: >38°C) ou hipotermia (temperatura: < 36°C) para crianças > 28 dias e ≤ 1 Ano.
- o Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes ≥70 anos.
- o Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção<sup>3</sup> ou aumento da secreção ou aumento da necessidade de aspiração.
- o Apneia ou taquipneia ou dispneia ou tosse (episódio novo ou com agravamento).
- o Ausculta com sibilos, roncos ou estertores (episódio novo ou com agravamento).
- o Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, por pelo menos 2 dias.

#### **E**

Pelo menos UM dos resultados abaixo:

- o Hemocultura positiva<sup>4</sup>, sem outro foco de infecção.
- o Cultura positiva do líquido pleural.
- o Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por procedimento com

menor potencial de contaminação (lavado broncoalveolar, escovado protegido e aspirado endotraqueal<sup>5</sup>)<sup>4</sup>.

- Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de  $\geq 5\%$  de leucócitos e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias intracelulares).
- Cultura positiva de tecido pulmonar.
- Exame histopatológico mostrando pelo menos uma das seguintes evidências de pneumonia:
  - Formação de abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos.
  - Evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-hifas.
- Vírus, *Bordetella*, *Legionella*, *Chlamydomphila* ou *Mycoplasma* identificados a partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou identificados por teste microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou tratamento.
- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para patógeno (exemplo: *Chlamydomphila*).
- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para *Legionella pneumophila* sorogrupo I titulada  $>1:128$  na fase aguda e convalescença por imunofluorescência indireta.
- Detecção de antígeno de *Legionella pneumophila* sorogrupo I em urina.
- Identificação de *Candida* spp. em amostra de sangue E de secreção respiratória (aspirado endotraqueal<sup>5</sup>, lavado broncoalveolar ou escovado protegido).
- Evidência de *Aspergillus* ou outros fungos filamentosos em amostra obtida por procedimento com menor potencial de contaminação (ex.: lavado broncoalveolar, escovado protegido e aspirado endotraqueal<sup>5</sup>) de uma das seguintes:
  - Exame de microscopia direta.
  - Cultura positiva de fungo.
  - Teste diagnóstico laboratorial (não cultura). Ex: método de biologia molecular, biomarcador galactomanana em amostra de lavado broncoalveolar e galactomanana sérica ascendente.

## E

Os sinais/sintomas e os exames de imagens e laboratoriais ocorreram no Período de Janela de infecção.

## Notas

Pacientes COM doença pulmonar ou cardíaca de base (exemplos: síndrome de desconforto respiratório agudo, displasia broncopulmonar, edema pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crônica), deve possuir no mínimo DOIS exames de imagens com as alterações descritas, com intervalo preferencial de 72 horas entre os exames, e no máximo 7 dias.

<sup>2</sup>Exemplos de exames de imagem: radiografia de tórax, tomografia computadorizada de tórax, ultrassom de tórax.

<sup>3</sup>Mudança nas características da secreção se refere a cor, consistência, odor e quantidade.

<sup>4</sup> Não se pode considerar como agente etiológico da PAV, mesmo que identificados em hemoculturas, microrganismos como: *Staphylococcus* coagulase negativo, *Enterococcus* spp., *Candida* spp. ou leveduras não especificadas. Esses microrganismos somente serão considerados como causadores de PAV se identificados em cultura de líquido pleural (onde a amostra foi obtida durante a toracocentese ou colocação inicial de dreno torácico e NÃO a partir de um dreno torácico já inserido) ou cultura de tecido pulmonar (biópsia). Exceção: em pacientes imunocomprometidos *Candida* spp. obtida por meio de aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar ou escovado protegido será considerada causadora de PAV se também for identificada em amostra de sangue.

<sup>5</sup>A aspiração traqueal só é considerada um procedimento com menor potencial de contaminação se coletada por tubo endotraqueal ou de traqueostomia.

<sup>6</sup>Pacientes imunocomprometidos incluem aqueles:

- Com neutropenia definida como contagem absoluta de neutrófilos ou contagem total de leucócitos  $<500 / \text{mm}^3$ .
- Com leucemia, linfoma ou HIV com contagem de CD4  $<200 \text{ cel}/\text{mm}^3$
- Esplenectomizados.
- Que tem histórico de transplante de órgão sólido ou células-tronco hematopoiéticas.
- Que estão em quimioterapia citotóxica.
- Em uso de altas doses de corticoides ou outros imunossupressores administrados por via enteral ou parenteral diariamente por  $> 2$  semanas na data do evento (por exemplo: para crianças:  $2\text{mg}/\text{kg}/\text{dia}$  ou mais, por mais de 14 dias ou  $20\text{mg}/\text{dia}$  ou mais, por mais de 14 dias de prednisona ou seu equivalente; para adultos e adolescentes:  $> 40\text{mg}$  de prednisona ou seu equivalente,  $> 160\text{mg}$  de hidrocortisona,  $> 32\text{mg}$  de metilprednisolona,  $> 6\text{mg}$  dexametasona,  $> 200\text{mg}$  cortisona).

## Critérios diagnósticos de PAV em pacientes adultos com covid-19

Esses critérios devem ser utilizados para todos os pacientes que tiveram covid-19, com complicações respiratórias e ventilação mecânica, independentemente do tempo de permanência da ventilação.

### Critério 5: PAV em pacientes adultos com Covid-19

Paciente com diagnóstico de covid-19 em uso de ventilador mecânico (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do VM) e que, na data da infecção, o paciente estava em uso de VM ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

#### E

após um período de melhora das trocas gasosas e afebril por pelo menos 2 dias consecutivos, apresenta pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:

- Febre (temperatura:  $>38^{\circ}\text{C}$ ) ou hipotermia, sem outra causa associada.
- Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração.
- Piora da troca gasosa<sup>1</sup>, dessaturação ou aumento da demanda de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, por pelo menos 2 dias.

#### E

Pelo menos um dos critérios abaixo:

- Hemocultura positiva<sup>2</sup>, sem outro foco de infecção
- Cultura positiva do líquido pleural
- Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar maior ou igual a  $10^5$  UFC/mL para bactérias obtidas por procedimento com menor potencial de contaminação (lavado broncoalveolar, escovado protegido ou aspirado endotraqueal)
- Antígeno urinário positivo para *Legionella* spp. ou pesquisa de *Chlamydomphila* ou *Mycoplasma* identificados a partir testes microbiológicos ou sorológico
- Identificação de *Aspergillus* spp. em secreção traqueal ou pesquisa positiva de galactomanana na secreção ou sangue.

#### E

Os sinais/sintomas e os exames laboratoriais ocorreram no Período de Janela de Infecção

#### Notas:

<sup>1</sup> aumento  $\geq 3$  cm H<sub>2</sub>O na PEEP ou um aumento  $\geq 20\%$  na fração mínima diária de oxigênio inspirado.

<sup>2</sup> qualquer espécie de *Candida* ou leveduras não especificadas, de *Staphylococcus* coagulase-negativo e de *Enterococcus* spp. somente serão considerados como causadores de PAV se identificados em cultura de líquido pleural (onde a amostra foi obtido durante a toracocentese ou colocação inicial de dreno torácico e NÃO a partir de um dreno torácico já inserido) ou cultura de tecido pulmonar (biópsia).

Exceção: em pacientes imunocomprometidos *Candida* spp. obtida por meio de aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar ou escovado protegido será considerada causadora de PAV se também for identificada em amostra de sangue e o critério de PAV for atendido.

### Critérios diagnósticos de PAV em neonatologia

#### PAV em recém-nascido $\leq 28$ dias<sup>1</sup>

Paciente em uso de ventilador mecânico (VM) por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do VM) e que na data da infecção o paciente estava em uso de VM ou o mesmo havia sido removido no dia anterior e :

SEM doença cardíaca ou pulmonar de base<sup>1</sup> com UM ou mais exames de imagem<sup>2</sup> seriados com um dos seguintes achados, sendo eles, novo ou persistente ou progressivo:

- o Infiltrado
- o Opacificação/consolidação
- o Cavitação
- o Pneumatocele

**E**

Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios, por pelo menos 2 dias

**E**

Pelo menos 03 (três) dos seguintes sinais e sintomas:

- Instabilidade térmica ( $T^a > 37,5^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ ) sem outra causa conhecida.
- Hemograma com  $\geq 3$  parâmetros alterados<sup>3</sup>.
- Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção<sup>4</sup> ou aumento da secreção ou aumento da necessidade de aspiração.
- Ausculta com sibilos, roncos ou estertores (episódio novo ou com agravamento).
- Bradicardia ( $< 100$  batimentos/min) ou taquicardia ( $> 160$  batimentos/min).
- Apneia, taquipneia, gemência e batimento de asa de nariz com retração torácica (episódio novo ou com agravamento)<sup>3</sup>.
- Tosse (episódio novo ou com agravamento).

**E**

Os sinais/sintomas e os exames de imagens e laboratoriais ocorreram no Período de Janela de Infecção.

### Notas

<sup>1</sup> Ou maior que essa idade no caso dos pacientes que permanecerem na unidade neonatal, principalmente prematuros. Se o paciente possuir idade  $> 28$  dias, mas está internado na UTI neonatal, aplica-se o critério para recém-nascido. Adotar esse critério até a alta da unidade neonatal, mesmo que a UTI seja mista: neonatal e pediátrica.

<sup>2</sup> RN COM doença pulmonar ou cardíaca de base, deve possuir no mínimo DOIS exames de imagens com as alterações descritas.

<sup>3</sup> Parâmetros clínicos, escore hematológico e outros parâmetros laboratoriais vide anexos do manual de neonatologia.

<sup>4</sup> Mudança nas características da secreção se refere a cor, consistência, odor e quantidade.

### Observações para todos os critérios de PAV:

1. Isoladamente, o diagnóstico de pneumonia estabelecido pelo médico não é um critério suficiente para estabelecer que o quadro pulmonar é de pneumonia, do ponto de vista epidemiológico, sendo necessário que os critérios acima sejam atendidos.
2. A pneumonia decorrente de aspiração maciça durante a intubação na sala de
3. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE
4. emergência deve ser considerada uma IRAS. Aspiração maciça é definida quando existe aspiração de conteúdo gástrico na via respiratória, como por exemplo restos

alimentares.

5. Múltiplos episódios de pneumonia podem ocorrer em pacientes com internação prolongada. No entanto, para considerar como um novo episódio deve ser levando em conta o prazo de infecção de repetição de 14 dias.
6. O crescimento de mais um microrganismo ou mudança no patógeno em cultura, isoladamente, também não é indicativo de novo episódio de pneumonia. Assim, é necessário o aparecimento de novos sinais e sintomas, alteração de imagem para essa definição e observar período de infecção de repetição de 14 dias.
7. Blastomices, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Criptococcus e Pneumocistis são microrganismos causadores de infecção comunitária e não devem ser considerados causadores de pneumonia relacionada à assistência à saúde. Embora, alguns estudos têm demonstrado a potencial transmissão do pneumocistis no ambiente hospitalar. Por isso, do ponto de vista epidemiológico, as pneumonias causadas por esses microrganismos não devem ser computadas como IRAS.
8. Quando mais de um exame de imagem é avaliado, a persistência de evidências de pneumonia nesses exames é um requisito para todos os pacientes e não só para aqueles com doenças cardíacas ou pulmonares prévias.
9. Para ajudar a separar processos pulmonares infecciosos dos não-infecciosos e ajudar a confirmar casos difíceis, é útil analisar os exames de imagem do dia do diagnóstico, 3 dias antes do diagnóstico, e nos dias 2 e 7 após o diagnóstico.
10. Ao identificar a persistência de evidências de pneumonia nos exames de imagem, o segundo exame de imagem deve ocorrer dentro de 7 dias após o primeiro, mas não é necessário que ocorra dentro do período de janela de infecção. A data do primeiro exame de imagem elegível será utilizada para determinar se os critérios de pneumonia são atendidos dentro do período de janela de infecção, isto é, todos os demais elementos devem ocorrer no período de janela de infecção.
11. O período de incubação da Legionelose é geralmente de 2 a 10 dias. Portanto, para fins epidemiológicos considera-se caso confirmado de Legionelose relacionada à assistência à saúde a infecção por este agente, confirmada laboratorialmente, em paciente com o início dos sintomas após 10 dias de internação e caso provável de Legionelose relacionada à assistência à saúde refere-se a infecção causada por este

agente, confirmada laboratorialmente, em paciente com o início dos sintomas entre 2 e 9 dias da internação.

12. Uma única anotação sobre a mudança no caráter da secreção ou sobre a presença de secreção purulenta não é significativa; repetidas anotações durante um período de 24 horas seriam mais um indicativo do início de um processo infeccioso. Variação do caráter da secreção remete a cor, consistência, odor e quantidade.
13. Orientações sobre aspectos laboratoriais das secreções respiratórias devem ser observadas de acordo com os Manuais de Microbiologia Clínica para o Controle de IRAS - Módulo 4 - procedimentos laboratoriais: da requisição do exame à análise microbiológica e laudo final: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes>

### Exemplos de Pneumonia associada à ventilação mecânica

Quadro 23: Exemplo de PAV definida clinicamente

Data	Dia de instalação do VM	Período de janela da infecção
05/07		
06/07	D1- Instalado VM	
07/07	D2	
08/07	D3	
09/07	D4	
10/07	D5	leucócitos 15000 cel/mm <sup>3</sup>
11/07	D6	leucócitos 17000 cel/mm <sup>3</sup>
12/07	D7	<b>Exame de imagem com infiltrado</b> Ausculta com roncosp Piora da troca gasosa
13/07	D8	Exame de imagem com infiltrado
14/07	D9	
15/07	D10	

16/07	D11	
17/07	D12	
18/07	D13	Exame de imagem com infiltrado persistente

- O período de janela de infecção iniciou no dia 07/07 e terminou no dia 15/07, o exame de imagem do dia 12/07 foi utilizado para definir o período de janela (03 dias antes e 03 dias depois). Como o paciente não possui doença de base, não é obrigatório a presença de 2 exames de imagens. Por isso o segundo (do dia D13) auxilia no diagnóstico, apesar de não fazer parte da janela.
- Data da infecção: 10/07, dia em que aparece o primeiro elemento do critério (leucócitos 15000 cel/mm<sup>3</sup>).
- Na data da infecção o paciente estava há mais de dois dias com o ventilador mecânico.
- Todos os elementos necessários para fechar o critério estão dentro do período da janela de infecção.
- Dessa forma, pode fechar a infecção como PAV.

Quadro 24 – Exemplo de PAV definida microbiologicamente

Data	Dia de instalação do VM	Período de janela da infecção
05/07		
06/07	D1	
07/07	D2	
08/07	D3	
09/07	D4	Febre (T <sup>a</sup> 38,5°C)
10/07	D5	Surgimento de secreção purulenta e leucocitose
11/07	D6	<b>Exame de imagem com infiltrado persistente</b>
12/07	D7	Aspirado traqueal com <i>Acinetobacter baumannii</i>
13/07	D8	
14/07	D9	<b>Exame de imagem com infiltrado persistente</b>
15/07	D10	

16/07	D11	
-------	-----	--

- O período de janela de infecção iniciou no dia 08/07 e terminou no dia 14/07, o exame de imagem do dia 11/07 foi utilizado para definir o período de janela (03 dias antes e 03 dias depois). Como o paciente possui doença cardíaca de base, foi necessário mais um exame de imagem dentro do período de janela de infecção.
- Data da infecção: 09/07, dia em que o primeiro elemento do critério apareceu (Febre: 38,5°C)
- Na data da infecção o paciente estava há mais de dois dias com o ventilador mecânico (no D4).
- Todos os elementos necessários para fechar o critério estão dentro do período da janela de infecção, inclusive o segundo exame de imagem.
- Dessa forma, pode-se fechar a infecção como PAV.

Quadro 25 – Exemplo de PAV em Pacientes Imunodeprimidos

Data	Dia de instalação do VM	Período de janela da infecção
05/07	D1	
06/07	D2	
07/07	D3	
08/07	D4	Febre (T <sup>a</sup> 38,3°C)
09/07	D5	
10/07	D6	<b>Exame de imagem com opacificação</b>
11/07	D7	
12/07	D8	
13/07	D9	Hemocultura positiva para <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
14/07	D10	
15/07	D11	
16/07	D12	Exame de imagem com opacificação persistente
	D13	

- O período de janela de infecção iniciou no dia 07/07 e terminou no dia 13/07, o exame de imagem do dia 10/07 foi utilizado para definir o período de janela (03 dias antes e 03 dias depois).
- O paciente é imunossuprimido.

- O paciente não possui doença cardíaca de base, então um exame de imagem é suficiente.
- Data da infecção foi dia 08/07, em que o primeiro elemento do critério aparece Febre ( $T^a$  38,3°C).
- Na data da infecção o paciente estava há mais de dois dias com o ventilador mecânico (D4).
- Todos os elementos necessários para fechar o critério estão dentro do período da janela de infecção.
- Dessa forma, pode-se fechar a infecção como PAV.

### 3.3 Critérios diagnósticos de Infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora (ITU-AC)

#### Critérios diagnósticos de Infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora (ITU-AC) em adultos e crianças sem lesão medular

Critério 1: ITU – AC em adultos e crianças > 3 anos
<p>Paciente &gt; 3 anos em uso de cateter vesical de demora por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava em uso do cateter ou o mesmo havia sido removido no dia anterior</p> <p><b>E</b> Apresenta pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas, sem outras causas reconhecidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Febre (<math>T^a &gt;38^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>○ Dor ou desconforto supra púbico</li> <li>○ Dor ou desconforto lombar</li> <li>○ Hematúria</li> <li>○ Urgência miccional<sup>1</sup></li> <li>○ Aumento da frequência miccional<sup>1</sup></li> <li>○ Disúria<sup>1</sup></li> </ul> <p><b>E</b> Possui cultura de urina positiva com, no máximo, duas espécies bacterianas<sup>2</sup> com contagem de colônias <math>\geq 10^5</math> UFC/mL, de pelo menos uma espécie.</p> <p><b>E</b></p>

- Os sinais/sintomas e a primeira urocultura positiva ocorreram no Período de Janela de Infecção

### **Critério 2: ITU-AC em Criança > 28 dias e ≤ 3 anos**

Paciente > 28 dias e ≤ 3 anos em uso de cateter vesical de demora por um período maior que dois dias consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava em uso do cateter ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

**E**

Apresenta pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas, sem outras causas reconhecidas:

- Febre ( $T^a > 38^{\circ}\text{C}$ ) ou hipotermia ( $T^a < 35^{\circ}\text{C}$ )
- Dor ou desconforto supra púbico ou lombar
- Urgência miccional ou aumento da frequência miccional ou disúria<sup>1</sup>
- Apneia
- Bradicardia
- Letargia
- Vômitos
- Hematúria

**E**

Possui cultura de urina positiva com, no máximo, duas espécies bacterianas<sup>2</sup> com contagem de colônias  $\geq 10^5$  UFC/mL, de pelo menos uma espécie.

**E**

Os sinais/sintomas e a primeira urocultura positiva ocorreram no Período de Janela de Infecção

## Notas

<sup>1</sup>Apenas em paciente que removeu o cateter no dia anterior à data da infecção, ou seja, sem cateter.

<sup>2</sup>Não considerar urocultura coletada por saco coletor. Admite-se  $\geq 10^3$  UFC/mL quando colhido por punção supra púbica em crianças. Em crianças imunodeprimidas considerar qualquer contagem de colônias, se a amostra tiver sido coletada por punção supra púbica.

## **Critérios diagnósticos de infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora (ITU-AC) em adultos e crianças com lesão medular**

As manifestações clínicas das infecções do trato urinário são frequentemente atípicas e inespecíficas em pacientes com lesão medular e podem envolver apenas o agravamento de sintomas neurológicos preexistentes. Por outro lado, alguns sintomas muito sugestivos, como febre, podem ter origem não infecciosa nesse grupo de pacientes. Por essa razão, os critérios para diagnóstico de ITU (devem ser diferenciados para esses pacientes, conforme descrito a seguir.

### **Critério 3: ITU-AC em adultos e crianças > 28 dias com lesão medular**

Paciente com lesão medular, em uso de cateter vesical de demora por um período maior que dois dias de consecutivos (ou seja, considerar a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava em uso do cateter ou o mesmo havia sido removido no dia anterior

#### **E**

Apresenta leucocitúria associada a pelo menos DOIS dos seguintes sinais e sintomas, sem outras causas reconhecidas:

- Febre ( $T^a >38^{\circ}\text{C}$ ) ou hipotermia ( $T^a <35^{\circ}\text{C}$ ) em criança  $\leq 3$  anos
- Piora da incontinência
- Piora da espasticidade
- Queda do estado geral
- Disreflexia autonômica

#### **E**


Possui cultura de urina positiva com, no máximo, duas espécies bacterianas com contagem de colônias  $\geq 10^5$  UFC/mL, de pelo menos uma espécie.

#### **E**

Os sinais/sintomas e a primeira urocultura positiva ocorreram no Período de Janela de Infecção.

## Observações sobre ITU-AC e ITU-AC em pacientes com lesão medular

- I. Cultura de urina com isolamento de quaisquer espécies de *Candida*, levedura não especificada, fungos dimórficos ou parasitas **NÃO** devem ser consideradas para o diagnóstico de ITU, do ponto de vista da vigilância. Mesmo se identificados na hemocultura, não podem ser considerados como agentes de infecção secundária a ITU.
- II. Cultura de urina com isolamento de quaisquer espécies de *Candida*, levedura não especificada, fungos dimórficos ou parasitas juntamente com espécie bacteriana com  $\geq 10^5$  UFC/mL, considerar apenas a bactéria para fins de notificação.
- III. Há grande probabilidade de ser contaminação da amostra quando são identificadas acima de duas espécies bacterianas na urocultura.
- IV. Cultura de ponta de cateter urinário **NÃO** é um teste laboratorial aceitável para o diagnóstico de ITU.
- V. O achado de bactérias no trato urinário não significa obrigatoriamente infecção, devendo ser desconsiderado, do ponto de vista epidemiológico, se não houver clínica de infecção (sinais ou sintomas). Neste caso, será considerado uma bacteriúria assintomática.
- VI. Infecções urinárias em pacientes que usam cateter duplo J são consideradas não associadas a cateter vesical.
- VII. As culturas de urina devem ser obtidas com a utilização de técnica apropriada: coleta por meio de micção espontânea ou cateterização. A urina coletada em paciente já cateterizado deve ser aspirada assepticamente do local próprio no circuito coletor e a cultura processada de forma quantitativa. É importante registrar o método de coleta no pedido de exame e no prontuário.
- VIII. Não existe um consenso na literatura em relação à necessidade de troca de cateteres diante de suspeita de ITU ou para coleta de urina. Portanto, não há indicação absoluta de troca do cateter para obter urina para cultura. A orientação sobre a necessidade de troca do cateter deve ser definida pela equipe assistencial juntamente com a CCIH e deve constar no protocolo do serviço.



## Exemplo de paciente com ITU-AC

Quadro 26 – Exemplo de ITU associada a cateter vesical de demora

DATA	Dia de instalação do cateter vesical	Período de janela da infecção
03/01	D1 - instalação do cateter vesical de demora	
04/01	D2	
05/01	D3	
06/01	D4	Febre > 38°C
07/01	D5	
08/01	D6	
09/01	D7	Urocultura coletada pelo cateter, positiva para <i>E. coli</i>
10/01	D8	
11/01	D9	
12/01	D10	

- O período de janela de infecção iniciou no dia 06/01 e terminou no dia 12/01, pois o primeiro exame positivo, que foi utilizado para definir o período de janela, foi coletado no dia 09/01 (janela: 03 dias antes e 03 dias depois dessa data).
- Na data da infecção o paciente estava há mais de dois dias com cateter vesical de demora.
- Todos os elementos necessários para fechar o critério estão dentro do período da janela de infecção.
- A amostra de urina para urocultura foi coletada por meio do cateter vesical de demora.
- Dessa forma, pode-se fechar como ITU.
- Data da infecção: 06/01

Quadro 27 – Exemplo de ITU em paciente com lesão medular

DATA	Dia de instalação do cateter vesical	Período de janela da infecção
03/01	D1 - instalação do cateter vesical de demora	
04/01	D2	
05/01	D3	
06/01	D4	Piora da espasticidade
07/01	D5	Episódios de disreflexia autonômica
08/01	D6	<b>Urocultura coletada pelo cateter, positiva para <i>E. coli</i></b>
09/01	D7	
10/01	D8	
11/01	D9	
12/01	D10	

- O período de janela de infecção iniciou no dia 05/01 e terminou no dia 11/01, pois o primeiro exame positivo, que foi utilizado para definir o período de janela, foi coletado no dia 08/01 (janela: 03 dias antes e 03 dias depois dessa data).
- Na data da infecção o paciente estava há mais de dois dias com cateter vesical de demora.
- Todos os elementos necessários para fechar o critério estão dentro do período da janela de infecção.
- A amostra de urina para urocultura foi coletada por meio de cateter de alívio.
- Dessa forma, pode-se fechar como ITU.
- Data da infecção: 06/01

## **4. Conceitos e critérios diagnósticos das infecções de sítio cirúrgico: pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos.**

### **Infecção de Sítio Cirúrgico**

São infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos em pacientes internados ou ambulatoriais.

### **Procedimento cirúrgico**

Ocorre quando há pelo menos uma incisão (incluindo abordagem laparoscópica e orifícios de broca craniana), realizada em um centro cirúrgico (sala de cirurgia, sala de cesariana, ou sala de radiologia intervencionista), feita através da pele, membrana mucosa ou de uma incisão que foi deixada aberta durante um procedimento cirúrgico anterior.

### **Data da infecção**

Para ISC, a data da infecção é a data da realização do procedimento cirúrgico.

### **Período de vigilância:**

Período após um procedimento cirúrgico em que o paciente deve ser monitorado para identificação de ISC, para fins de vigilância das IRAS. Para as ISC incisional superficial o período de vigilância é de 30 dias. Já para as ISC incisional profunda e ISC órgão/cavidade, o período de vigilância é determinado de acordo com o procedimento cirúrgico, podendo ocorrer durante o período de 30 dias ou de 90 dias após o procedimento, sendo que o dia 1 é data da cirurgia. Os procedimentos cirúrgicos a serem monitorados por 90 dias, cujas infecções relacionadas são de notificação nacional obrigatória são: implante de prótese mamária, implante de prótese de quadril primária, implante de prótese de joelho primária, revascularização do miocárdio, derivação interna

nerológica e cirurgia de catarata.

Quando houver necessidade de retornar ao centro cirúrgico para realização de uma abordagem cirúrgica no mesmo sítio operatório deve ser reiniciado um novo período de vigilância para ISC. Por exemplo: se um paciente fez um procedimento cirúrgico e no 5º PO, devido a um sangramento, teve que retornar ao centro cirúrgico para fazer uma nova abordagem no sítio cirúrgico operado, a contagem do período de vigilância deverá ser reiniciada a partir do zero.

Nota: No caso de identificação de Micobactéria Não Tuberculosa / Micobactéria de Crescimento Rápido (MNT/MCR) considerar até 24 meses após realização do procedimento cirúrgico como critério para diagnóstico de ISC. A notificação de MNT/MCR é obrigatória e deve ser realizada no Formulário Nacional de Notificação de surtos infecciosos em serviços de saúde: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-e-resistencia-microbiana/notificacao-de-iras-e-rm>

**Vigilância pós alta:** método de busca ativa de ISC em pacientes que já receberam alta do serviço de saúde após ter realizado um procedimento cirúrgico. A vigilância pós alta deve ser durante o período de vigilância da ISC, ou seja, 30 dias ou 90 dias a depender do procedimento cirúrgico.

#### **4.1 Infecções de sítio cirúrgico de notificação nacional obrigatória**


As infecções de sítio cirúrgico de notificação nacional obrigatória para o ano de 2025 são infecções que ocorrem após: cirurgia cesariana, implante de prótese mamária, implante de prótese de quadril primária, implante de prótese de joelho primária, infecções pós-revascularização do miocárdio, infecções pós-cirurgia de derivação interna neurológica e endoftalmite após facectomia (cirurgia de catarata). Para as endoftalmite após procedimentos oftalmológicos invasivos (intra ou extra-hospitalares), vide Nota Técnica GVIMS/GGTES/Dire3 nº 05/2025.

Essas infecções devem ser definidas conforme a classificação e critérios

definidores de infecção de sítio cirúrgico (ISC) apresentados no quadro abaixo:

### Classificação e critérios definidores de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)

As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos, em pacientes internados ou ambulatoriais, sendo classificadas conforme os planos acometidos ilustrados na figura abaixo e definidas de acordo com os critérios de sítios específicos, no caso de infecção de órgão ou cavidade, descritos no manual de critérios diagnósticos de IRAS.



Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) **Incisional Superficial (IS)**

Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) **Incisional Profunda (IP)**

Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) **Órgão/ Cavidade (OC)**

## ISC Incisional Superficial (IS)<sup>2</sup>

Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento) e envolve apenas pele e tecido subcutâneo e apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:

1. Drenagem purulenta da incisão superficial;
2. Microrganismo identificado em secreção ou tecido da incisão superficial, obtido assepticamente\*<sup>1</sup> por cultura ou por outro método microbiológico não baseados em cultura\*<sup>2</sup>;
3. A incisão superficial é deliberadamente aberta pelo cirurgião ou outro médico na vigência de, pelo menos, um dos seguintes sinais ou sintomas: dor, aumento da sensibilidade, edema local, hiperemia ou calor;
4. Diagnóstico de infecção superficial pelo cirurgião ou outro médico.

### Observações:

\*1 - Não serão considerados os resultados de culturas positivas quando coletadas através de *swabs* (hastes com ponta de algodão).

\*2 - Realizados para fins de diagnóstico clínico ou tratamento (excluindo culturas/teste de vigilância).

Não oconsiderar inflamação mínima e drenagem de secreção limitada aos pontos de sutura como ISC incisional.

## ISC Incisional Profunda (IP)

Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento) ou até 90 dias, a depender do tipo de procedimento, envolve tecidos moles profundos à incisão (ex.: fáscia e/ou músculos) e apresenta pelo menos **UM** dos seguintes critérios:

1. Drenagem purulenta da incisão profunda, mas não originada de órgão/cavidade.
2. Incisão profunda aberta ou aspirada pelo cirurgião ou outro médico  
**E**  
microrganismo identificado em tecido moles profundos da incisão\*<sup>1</sup> por cultura ou outro método microbiológico não baseados em cultura\*<sup>2</sup> OU não realizados exames para essa identificação (a cultura realizada com resultado negativo não preenche este critério).  
**E**  
paciente apresenta pelo menos 1 dos seguintes sinais e sintomas: febre (temperatura >38°C), dor ou aumento da sensibilidade localizada.
3. Abscesso ou outra evidência de infecção envolvendo tecidos profundos, detectado durante exame clínico, anatomopatológico ou de imagem.
4. Diagnóstico de infecção incisional profunda feito pelo cirurgião ou médico assistente

### Observações:

\*1 - Não serão considerados os resultados de culturas positivas quando coletadas através de *swabs* (hastes com ponta de algodão).

\*2 - Realizados para fins de diagnóstico clínico ou tratamento (excluindo culturas/teste de vigilância).

Não considerar inflamação mínima e drenagem de secreção limitada aos pontos de sutura como ISC incisional.

## ISC Órgão/ Cavidade (OC)<sup>3</sup>

Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento) ou até 90 dias, a depender do tipo de procedimento, envolve qualquer órgão ou cavidade mais profunda do que fáscia e músculo que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia e apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:

1. Drenagem purulenta de um dreno colocado no órgão/espaco (por exemplo, sistema de drenagem de sucção fechado, dreno aberto, dreno de tubo em T, drenagem guiada por TC)
2. Microrganismo identificado em secreção ou tecido do órgão/cavidade, obtido

aspticamente\*1 por cultura ou outro método microbiológico, não baseados em cultura.

3. Presença de abscesso ou outra evidência que a infecção envolve os planos profundos da ferida (órgão/cavidade) identificada ao exame anatômico, histopatológico ou de imagem conclusivo ou sugestivo de infecção;
4. Diagnóstico de infecção de órgão/cavidade pelo cirurgião, preferencialmente, ou outro médico

**E**

Atende pelo menos UM dos critérios definidores de infecção em um sítio específico, que também são aplicáveis para definição de ISC/OC, disponíveis no manual de critérios diagnósticos de IRAS\*3.

**Observações:**

\*1 - Não serão considerados os resultados de culturas positivas quando coletadas através de *swabs* (hastes com ponta de algodão).

\*2 - Realizados para fins de diagnóstico clínico ou tratamento (excluindo culturas/teste de vigilância).

\*3 - Os critérios definidores de infecções do sítio cirúrgico órgão/cavidade estão disponíveis no último capítulo do manual de critérios diagnósticos de IRAS

**IMPORTANTE:** sempre computar a infecção do plano mais profundo. Desta forma:

- Se o critério fechar ISC incisional superficial e ISC incisional profunda - computar apenas a ISC incisional profunda;
- Se o critério fechar ISC incisional profunda e ISC órgão/cavidade - computar apenas a ISC órgão/cavidade;
- Se o critério fechar para ISC incisional superficial e ISC órgão/cavidade - computar apenas a ISC órgão/cavidade.

**A PARTIR DE 2025, AS INFECÇÕES DE SÍTIO CIRURGICO (ISC) SERÃO NOTIFICADAS NO FORMULÁRIO NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO DE FORMA SEPARADA EM: ISC INCISIONAL (SUPERFICIAL E PROFUNDA) E ISC ORGÃO/CAVIDADE.**

Desta forma, o número de ISC incisional, relacionadas ao procedimento X, notificadas + número de ISC órgão/cavidade, relacionadas ao procedimento X, notificadas deve ser igual ao número total de ISC relacionadas ao procedimento X ocorridas no serviço.

## Exemplos de Infecção de Sítio Cirúrgico

Quadro 28 – Exemplo de Infecção de Sítio Cirúrgico Incisional Superficial

Data	Histórico/dados	Observação
04/03	D1- Paciente de 30 anos de idade, sem sinais de infecção, realiza uma cirurgia colocação de prótese primária de quadril	Inicia-se a contagem de 90 dias, para a vigilância da ISC relacionada a esse procedimento
....		
....		
....		
20/03	Observada drenagem de secreção purulenta pela ferida operatória em pequena quantidade	Primeiro elemento para definir o critério
23/03	Apresentando edema, calor e eritema na ferida operatória	
24/03	O cirurgião realiza a abertura da ferida operatória para melhorar a drenagem da secreção	
30/03	Exame de imagem sem alterações	

- Os elementos que definem o critério ocorrem dentro dos 30 dias após a cirurgia e são suficientes para definir uma ISC superficial.
- A data da infecção: 04/03 (data do procedimento cirúrgico)

Quadro 29 – Exemplo de Infecção de Sítio Cirúrgico de órgão ou cavidade

Data	Histórico/dados	Observação
02/06	D1 - Paciente com 45 dias de vida, sem sinais de infecção, realiza cirurgia para colocação de válvula de derivação ventrículo-peritoneal (DVP)	Inicia-se a contagem de 90 dias, para a vigilância da ISC relacionada a esse procedimento.
....		
....		
08/08	Observada drenagem de secreção purulenta pela ferida operatória do abdômen em pequena quantidade. Apresenta edema, calor e eritema na ferida operatória	Primeiro elemento para definir o critério
10/08	O cirurgião decide reoperar a criança para retirar a válvula da DVP e colhe o exame do Líquor (LCR)	

13/08	Resultado da cultura do LCR positiva para <i>Staphylococcus epidermidis</i> e apresentando 125 células com predomínio de polimorfonucleares, hiperproteínoorraquia e hipoglicorraquia.	Atende o critério 1 de meningite
-------	--	----------------------------------

- Os elementos que definem o critério estão dentro de 90 dias observados para essa cirurgia.
- O paciente apresenta uma ISC superficial.
- Também fechou o critério diagnóstico de meningite e, portanto, de uma ISC de órgão/cavidade – Meningite.
- Nesse caso, deve ser computada e notificada apenas a uma ISC de órgão/cavidade.

Os procedimentos cirúrgicos e as ISC (cirúrgico incisional superficial, incisional profunda ou órgão/cavidade) relacionadas a estes procedimentos, que são definidas como de notificação nacional obrigatória, estão descritas no quadro abaixo. Neste quadro também são descritos quais sítios específicos podem ser classificados como infecção de órgão/cavidade para esses procedimentos cirúrgicos.

Os critérios diagnósticos que caracterizarão as ISC órgão/cavidade dos sítios específicos estão descritos no manual de critérios diagnósticos de IRAS.

## Procedimentos cirúrgicos e ICS relacionadas a esses procedimentos

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	SÍTIOS E TIPOS DE INFECÇÕES DE SÍTIO CIRÚRGICO (ISC) POSSÍVEIS RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE NOTIFICAÇÃO NACIONAL OBRIGATÓRIA*
Cesariana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial</li> <li>• ISC incisional profunda</li> <li>• ISC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Endometrite</li> <li>○ Trato gastrointestinal</li> <li>○ Infecção intra-abdominal, não especificada em outros locais</li> <li>○ Infecção do tecido pélvico profundo ou outra infecção do trato reprodutivo masculino ou feminino</li> <li>○ Infecção do Sistema Urinário</li> </ul> </li> </ul>
Cirurgia de mama, incluindo cirurgia para colocação de prótese mamária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial</li> <li>• ISC incisional profunda</li> <li>• ISC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abscesso ou mastite</li> </ul> </li> </ul>
Revascularização do miocárdio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial</li> <li>• ISC incisional profunda</li> <li>• ISC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Miocardite ou pericardite</li> <li>○ Endocardite</li> <li>○ Mediastinite</li> <li>○ Infecção arterial ou venosa</li> <li>○ Osteomielite</li> <li>○ Infecção intra-abdominal, não especificada em outros locais</li> <li>○ Outras infecções do trato respiratório inferior</li> </ul> </li> </ul>
Prótese de quadril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial</li> <li>• ISC incisional profunda</li> <li>• ISC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Infecção articular periprotética</li> <li>○ Osteomielite</li> </ul> </li> </ul>
Prótese de joelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial</li> <li>• ISC incisional profunda</li> <li>• ISC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Osteomielite</li> <li>○ Infecção articular Peri protética</li> </ul> </li> </ul>
Derivação ventricular Interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial</li> <li>• ISC incisional profunda</li> <li>• ISC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Osteomielite</li> <li>○ Infecção intra-abdominal, não especificada em outros locais</li> <li>○ Infecção intracraniana</li> <li>○ Outras infecções do trato respiratório inferior</li> <li>○ Meningite ou ventriculite</li> <li>○ Abscesso/infecção espinhal</li> </ul> </li> </ul>
Facetomia (cirurgia de catarata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISC incisional superficial – conjuntivite (não é de notificação nacional obrigatória)</li> <li>• SC órgão/cavidade:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Endoftalmite</li> </ul> </li> </ul>

## Referências

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caderno 2 da Série: Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde: Critérios Diagnósticos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 2017.

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caderno 3 da Série: Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde: Critérios Diagnósticos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde Neonatologia. 2017.

Centers for Disease Control and Prevention- CDC. National Healthcare Safety Network (NHSN) Patient Safety Component Manual. 2024. Disponível em:  
[https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/pcsmanual\\_current.pdf](https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/pcsmanual_current.pdf)

Centers for Disease Control and Prevention- CDC. Antibiotic Prescribing and Use. Disponível em:  
<https://www.cdc.gov/antibiotic-use/core-elements/collecting-cultures.html>

Healthcare-Associated Infections (HAIs): Strategize Initiatives You Can Incorporate Into Your Program. Disponível em: <https://www.cdc.gov/hai/prevent/cauti/indwelling/strategize.html>

Infectious Diseases Society of America (IDSA). A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2018 Update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. Disponível em: <https://www.idsociety.org/practice-guideline/laboratory-diagnosis-of-infectious-diseases/>

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Technical Document. Surveillance of healthcare-associated infections and prevention indicators in European intensive care units HAI-Net ICU protocol, version 2.2. Disponível em: [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HAI-Net-ICU-protocol-v2.2\\_0.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HAI-Net-ICU-protocol-v2.2_0.pdf).

Di Santo MK, Takemoto D, Nascimento RG, et al. Cateteres centrais de inserção periférica: alternativa ou primeira escolha em acesso vascular. J Vasc Bras . 2017; 16 (2): 104-112. doi: 10.1590 / 1677-5449.011516.

Ferreira EG, Yatsuda F, Pini M, et al. Implications of the presence of yeasts in tracheobronchial secretions of critically ill intubated patients. *EXCLI J.* 2019;18:801-811. Published 2019 Sep 9. doi:10.17179/excli2019-1631.

AAP. Reaffirmation of AAP Clinical Practice Guideline: The Diagnosis and Management of the Initial Urinary Tract Infection in Febrile Infants and Young Children 2–24 Months of Age. *Pediatrics.* 2016;138(6):e20163026

AAP. Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. *Pediatrics.* 2011, 128(3): 595-610.

BADIEE P, ALBORZI A, KARIMI M, POURABBAS B, HADDADI P, MARDANEH J, MOIENI M. Diagnostic potential of nested PCR, galactomannan EIA, and beta-D-glucan for invasive aspergillosis in pediatric patients. *J Infect Dev Ctries.* 2012; 6(4):352-7.

Grabe M., Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Wullt B, Çek M, Naber KG, Pickard RS, Tenke P, Wagenlehner F. Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2012. Available from: [http://www.uroweb.org/gls/pdf/17\\_Urological%20infections\\_LR%20II.pdf](http://www.uroweb.org/gls/pdf/17_Urological%20infections_LR%20II.pdf).

Harrison G. J. Opportunistic Infections in Kidney Transplantation. In: Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 8th ed, v 1, Elsevier: Philadelphia. 2019, 715-724.

HUSKINS WC, SAMMONS J S, COFFIN SE. Health Care–Associated Infections. In: Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 8th ed, v 2, Elsevier: Philadelphia. 2019, 2514-2542.

NICE. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Urinary tract infection in children diagnosis, treatment and long-term management. RCOG Press: London. 2007, 178

p. <https://www.nice.org.uk/guidance/CG54>. PATRICK S.W., Kawai A.T., Kleinman K., Jin R., Vaz L., Gay C., Kassler W., Goldmann D., Lee G.M. Health Care-Associated Infections Among Critically Ill Children in the US, 2007–2012. *Pediatrics.* 2014,134:705–712.

Wald. ER. Cystitis and Pyelonephritis. In: Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 8th ed, v 1, Elsevier: Philadelphia. 2019, 395-408.

ZINGG W., Hopkins S., Gayet-Ageron A., Holmes A., Sharland M., Suetens C., ECDC PPS study group. Health-care-associated infections in neonates, children, and adolescents: an analysis of paediatric data from the European Centre for Disease Prevention and Control point- prevalence survey. *Lancet Infect Dis* 2017; 17: 381–89.

Zorc J.J. ; Kiddoo D.A.; Shaw K.N.. Diagnosis and Management of Pediatric Urinary Tract Infections. *Clinical Microbiology Reviews*. 2005,18(2):417-422. doi:10.1128/CMR.18.2.417– 422.2005.

## ANEXO 1

### Infecção de Corrente Sanguínea (ICS) Secundária

Para facilitar a diferenciação adequada entre uma infecção primária de corrente sanguínea (IPCSL) associada a cateter central, de acordo com os critérios diagnósticos nacionais, e uma Infecção de corrente sanguínea (ICS) secundária, serão apresentados nesse anexo alguns conceitos e o critério para definição de ICS secundária.

Ressalta-se que, apesar de ser fundamental o serviço fazer a vigilância da ICS secundária e da infecção primária de corrente sanguínea não associada à cateter central, essas infecções não devem ser notificadas para a Anvisa. Só devem ser notificadas para o Sistema Nacional as infecções primárias de corrente sanguínea associadas a cateter central.

Considera-se **infecção de corrente sanguínea (ICS) secundária** quando ocorrer a identificação em hemocultura de microrganismo infeccioso na corrente sanguínea que está associado a um outro foco infeccioso específico. Neste caso, a infecção de corrente sanguínea é secundária a outro foco infeccioso específico, que é o foco primário da infecção.

**Para que uma infecção da corrente sanguínea seja considerada secundária a outro foco de infecção, em um paciente de qualquer idade, os seguintes requisitos devem ser atendidos:**

<b>Infecção de corrente sanguínea secundária</b>
<p>Paciente com diagnóstico epidemiológico de infecção em um sítio específico, que não a corrente sanguínea, conforme definido nos critérios diagnósticos nacionais (ex: infecção do trato urinário, pneumonia, infecção de sítio cirúrgico ou de outras topografias de infecções)</p> <p style="text-align: center;"><b>E</b></p> <p><b>Atender a um dos seguintes cenários:</b></p> <p><b>Cenário 1:</b> pelo menos um microrganismo na amostra de sangue é encontrado na cultura de material coletado em um dos sítios específicos definidos acima. <b>E</b> a amostra de sangue é coletada no período de atribuição da infecção de corrente sanguínea</p>

secundária (período de janela de infecção + período de repetição de infecção)


**OU**

**Cenário 2:** pelo menos um microrganismo identificado na amostra de sangue é um elemento usado para atender ao critério de infecção de um dos sítios específicos definidos acima, ou seja, faz parte do critério dessa infecção, e a amostra de sangue foi coletada durante o período de janela de infecção desse sítio específico.

### **Período de atribuição da infecção de corrente sanguínea secundária (PAICS)**

Período no qual uma amostra de sangue, para hemocultura, deve ser coletada para que o microrganismo identificado, como causador da infecção da corrente sanguínea, possa ser atribuído a um outro foco infeccioso (foco primário da infecção) e, portanto, para que essa infecção de corrente sanguínea seja classificada como secundária. Esse período é definido pela combinação entre o período de janela de infecção com o período de infecção de repetição, podendo variar de 14 a 17 dias.

Figura 1: ICS secundária.



\* Exceções:

1. A definição de enterocolite necrosante não inclui resultado de hemocultura no seu critério diagnóstico. No entanto, como exceção, é possível a atribuição de uma ICS secundária a enterocolite necrosante, se o paciente atender ao critério diagnóstico de enterocolite necrosante E no período de atribuição de ICS Secundária tiver um microrganismo patogênico identificado a partir de uma amostra de sangue ou um microrganismo contaminante de pele (comensal) identificado a partir de 2 ou mais amostras de sangue coletadas em ocasiões diferentes no mesmo ou em dias consecutivos.

2. Qualquer espécie de *Candida* ou leveduras não especificadas, de *Staphylococcus* coagulase-negativo e de *Enterococcus* identificados em amostra de sangue, somente poderão ser atribuídos como causador de ICS secundária à pneumonia se esses microrganismos forem identificados em cultura de líquido pleural (onde a amostra foi obtido durante a toracocentese ou colocação inicial de dreno torácico e NÃO a partir de um dreno torácico já inserido) ou cultura de tecido pulmonar (biópsia) e a data de coleta da cultura de sangue está dentro do PAICS. Exceção: em pacientes imunocomprometidos, *Candida* pode ser atribuída como agente causador de ICS secundária à pneumonia se for identificada em amostra de cultura de aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar ou escovado protegido, coletada dentro do período de janela de infecção, e identificada em amostra de sangue.

### Exemplos sobre ICS secundária

**Exemplo** (Quadro 30) – Paciente com infecção do trato urinário (definida de acordo com o critério diagnóstico nacional). Apresentou febre 8 dias depois da data da ITU e teve hemocultura positiva para *Escherichia coli* no dia seguinte após apresentar febre. Considerando que a hemocultura positiva não é um elemento que faz parte do critério diagnóstico de infecção do trato urinário (não é um elemento que define a infecção), deve ser verificado se há pelo menos um agente infeccioso em comum (entre o resultado da hemocultura e urocultura) e se a hemocultura foi realizada dentro do período para atribuição da ICS secundária para definir se a infecção de corrente sanguínea é secundária:

Quadro 30– Exemplo de Infecção de Corrente Sanguínea secundária

Data	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição	Período para atribuição de ICS secundária
30/12			
31/12			
01/01			
02/01			
03/01			Início da contagem do período de atribuição da ICS secundária 1
04/01			2
05/01	Disúria	Início da contagem do prazo de infecção de repetição 1	3
06/01	<b>Urocultura positiva para <i>E. coli</i></b>	2	4
07/01		3	5
08/01		4	6
09/01		5	7
10/01		6	8
11/01		7	9
12/01		8	10
13/01	Febre > 38°C	9	11
14/01	Hemocultura positiva para <i>E. coli</i>	10	12
15/01		11	13
16/01		12	14
17/01		13	15
18/01		14	16
19/01			
20/01			
21/01			
22/01			
23/01			
24/01			

**Neste caso deve ser considerado:**

Infecção do trato urinário e infecção de corrente sanguínea secundária a ITU (uma vez que a urocultura e a hemocultura tiveram o mesmo microrganismo e a hemocultura foi realizada dentro do período de atribuição da ICS secundária)

**Microrganismo causador da infecção:** *E. coli*

**Data da ITU:** 05/01.

**Exemplo (Quadro 31):** Paciente com infecção do trato urinário (definida de acordo com o critério diagnóstico nacional). Dez dias após a data da ITU, apresentou febre e a hemocultura no dia seguinte foi positiva para *Acinetobacter baumannii*. Considerando que a hemocultura positiva não é um elemento que faz parte do critério diagnóstico epidemiológico de infecção do trato urinário (não é um elemento que define a infecção), deve ser verificado se há pelo menos um agente infeccioso em comum (entre o resultado da hemocultura e urocultura) e se a hemocultura foi realizada dentro do período para atribuição da ICS secundária para definir se a infecção de corrente sanguínea é secundária.

Quadro 31 – Exemplo de Infecção de Corrente Sanguínea primária ou secundária

Data	Cateter central	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição	Período para atribuição de ICS secundária
30/12				
31/12				
01/01				
02/01				
03/01				Início da contagem do período de atribuição da ICS secundária 1
04/01				2
05/01		Disúria	Início da contagem do prazo de infecção de repetição 1	3
06/01		Urocultura positiva para <i>E. coli</i>	2	4
07/01			3	5
08/01			4	6
09/01			5	7
10/01			6	8
11/01			7	9
12/01			8	10
13/01	D1		9	11
14/01	D2		10	12
15/01	D3	Febre > 38°C	11	13
16/01	D4	Hemocultura positiva para <i>Acinetobacter baumannii</i>	12	14
17/01	D5		13	15
18/01	D6		14	16
19/01	D7			
20/01	D8			
21/01	D9			

**Neste caso deve ser considerado:**

▪ **Infecção do trato urinário (ITU)**

- **Data da infecção: 05/01**

**Microrganismo** causador da infecção: *E. coli*

E

▪ **Infecção Primária de Corrente Sanguínea associada a cateter central** (apesar da hemocultura ter sido realizada dentro do período de atribuição da ICS secundária não há um Microrganismo comum entre a hemocultura e a urocultura).

- **Data da infecção: 16/01**

✓ Microrganismo causador da infecção: *Acinetobacter baumannii*. Isso porque a IPCSL associada a cateter por Microrganismo patogênico não precisa de outro sinal/sintoma para fechar o critério, além de hemocultura positiva. Isso explica também a data da infecção ser dia 16/01.

**Exemplo** (Quadro 32) Paciente com PAV segundo critério diagnóstico de PAV microbiologicamente confirmada e hemocultura positiva para *S. aureus*. Como a hemocultura positiva faz parte da definição do critério diagnóstico de PAV microbiologicamente confirmada e foi coletada dentro do período de janela de infecção, então a infecção de corrente sanguínea é secundária. Neste caso, não há necessidade de considerar o PAICS.

Quadro 32 - Exemplo de infecção de corrente sanguínea secundária

Data	Ventilador mecânico	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição	Período para atribuição de ICS secundária
30/12				
31/12				
01/01				
02/01				
03/01	D1			
04/01	D2			
05/01	D3	Febre > 38°C	Início da contagem do prazo de infecção de repetição 1	
06/01	D4	RX de tórax com infiltrado	2	
07/01	D5	Hemocultura positiva para <i>S. aureus</i>  Ausculta com roncosp	3	
08/01	D6		4	
09/01	D7		5	
10/01	D8		6	
11/01	D9		7	
12/01	D10		8	
13/01	D11		9	
14/01	D12		10	
15/01	D13		11	
16/01	D14		12	
17/01	D15		13	
18/01	D16		14	

**Neste caso deve ser considerado:** PAV e Infecção de corrente sanguínea secundária a PAV

**Data da PAV:** 05/01

**Microrganismo causador da infecção:** *S. aureus*

**Exemplo (Quadro 33)** - Paciente em uso de cateter central e cateter vesical de demora por um período maior que 2 dias. Em 01/12 apresenta febre > 38°C e posteriormente, urocultura e hemocultura positiva para *Escherichia coli*. Em 11/12 paciente teve novo episódio de febre

> 38°C, sendo coletadas urocultura, cujo resultado foi negativo, e hemocultura, que foi positiva para *Acinetobacter baumannii*. Paciente não possui outro foco infeccioso.

Quadro 33 – Exemplo de infecção de corrente sanguínea primária e secundária

Data	Cateter vesical de demora	Cateter central	Período de janela da infecção	Prazo para infecção de repetição	Período para atribuição de ICS secundária
30/12	D3	D4			Início da contagem do período de atribuição da ICS secundária 1
31/12	D4	D5			2
01/01	D5	D6	Febre > 38°C	Início da contagem do PIR 1	3
02/01	D6	D7	<b>Urocultura positiva para <i>E. coli</i></b>	2	4
03/01	D7	D8	Hemocultura positiva para <i>E. coli</i>	3	5
04/01	D8	D9		4	6
05/01	D9	D10		5	7
06/01	D10	D11		6	8
07/01	D11	D12		7	9
08/01	D12	D13		8	10
09/01	D13	D14		9	11
10/01	D14	D15		10	12
11/01	D15	D16	<b>Febre &gt; 38° C</b> <b>Hemocultura positiva para <i>Acinetobacter baumannii</i></b>	11	13
12/01	D16	D17		12	14
13/01	D17	D18		13	15
14/01	D18	D19		14	16

Neste caso, temos: Uma ITU associada à cateter vesical de demora e uma infecção de corrente sanguínea secundária (foco: trato urinário), uma vez que há um agente infeccioso

em comum (*E. coli*) e a hemocultura foi realizada dentro do PAICS. E também temos uma IPCSL associada à cateter central, apesar do intervalo ser menor que 14 dias entre os dois eventos (contando a partir da data da primeira infecção) não há uma relação da primeira (que é secundária à ITU) com a segunda ICS, que é primária, pois não possui um foco secundário (não há um agente infeccioso em comum com a ITU). Portanto, nessa segunda infecção não se aplica o período de infecção de repetição e nem o PAICS.

**Neste caso deve ser considerado:**

- ITU associada à cateter vesical de demora e ICS secundária
  - **Data da ITU:** 01/01
  - **Microrganismo responsável:** *E. coli*
  
- IPCSL associada à Cateter Central
  - **Data da infecção:** 11/01
  - **Microrganismo responsável:** *Acinetobacter baumannii*

## ANEXO 2

### Checklist dos itens a serem observados nos critérios diagnósticos de IRAS associadas a dispositivos invasivos



#### CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER CENTRAL

*CHECKLIST DOS ITENS A SEREM OBSERVADOS PARA A DEFINIÇÃO DA INFECÇÃO*

- 1 Idade do paciente
- 2 Tempo de uso do cateter
- 3 Resultados da Hemocultura
- 4 Sinais e sintomas
- 5 Coleta adequada da amostra de sangue
- 6 Período de janela de infecção
- 7 Data da infecção
- 8 Presença de infecção secundária



#### CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECANICA

*CHECKLIST DOS ITENS A SEREM OBSERVADOS PARA A DEFINIÇÃO DA INFECÇÃO*

- 1 Tempo de uso do ventilador
- 2 Resultados de exames de imagens
- 3 Resultados de exames laboratoriais
- 4 Sinais e sintomas
- 5 Período de janela de infecção
- 6 Data da infecção
- 7 Exclusão de Microrganismos comunitários não associados à PAV



#### CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO ASSOCIADA A CATETER VESICAL DE DEMORA

*CHECKLIST DOS ITENS A SEREM OBSERVADOS PARA DEFINIÇÃO DA INFECÇÃO*

- 1 IDADE DO PACIENTE
- 2 TEMPO DE USO DO CATETER
- 3 VESICAL DE DEMORA
- 4 SINAIS E SINTOMAS
- 5 RESULTADOS DA UROCULTURA
- 6 COLETA ADEQUADA DA AMOSTRA DE URINA
- 7 PERÍODO DE JANELA DE INFECÇÃO
- 8 DATA DA INFECÇÃO



# ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária