



**FORMULÁRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS  
ATRAVÉS DO CEAF/SC PARA O TRATAMENTO DE  
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES)  
PORTARIA SAS/MS Nº 21 DE 01/11/2022**



Declaro, para fins de solicitação de medicamentos para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, que a(o) paciente \_\_\_\_\_ não apresenta critérios de exclusão e satisfaz **os critérios de classificação**, propostos pelo American College of Rheumatology (ACR) 1982/1997, SLICC 2012 ou Eular/ACR 2019.

**Favor assinalar os critérios de inclusão apresentados pelo paciente (Item 1 OU Item 2 OU Item 3):**

**Item 1. Critérios da American College of Rheumatology (ACR) 1982/1997:**

O paciente pode ser classificado com LES a partir da presença de, pelo menos, **4 dos 11 critérios** descritos abaixo, em qualquer momento da vida:

- Eritema malar;
- Lesão discóide;
- Fotossensibilidade;
- Úlcera oral;
- Artrite:** artrite não erosiva envolvendo 2 ou mais articulações periféricas, caracterizada por dor à palpação, edema ou derrame;
- Serosite;
- Alteração renal:** proteinúria persistente maior que 0,5 g/dia ou acima de +++ se não quantificada ou presença de cilindros celulares – **Anexar exames comprobatórios;**
- Alteração neurológica;**
- Alterações hematológicas:** anemia hemolítica com reticulocitose e/ou leucopenia  $< 4.000/mm^3$  e/ou linfopenia  $< 1.500/mm^3$  e/ou trombocitopenia  $< 100.000/mm^3$  - **Anexar exames comprobatórios;**
- Alterações imunológicas:** presença de: anti-DNA nativo, **ou** anti-Sm, **ou** anticorpos antifosfolípidios (anticardiolipina, anticoagulante lúpico) - **Anexar exames comprobatórios;**
- Anticorpo antinuclear (FAN):** título anormal - **Anexar exame comprobatório.**

**Item 2. Critérios SLICC 2012:**

O paciente pode ser classificado como com LES quando apresentar:

1. Pelo menos **4** dos critérios a seguir, incluindo pelo menos 1 **critério clínico (item 2.1)** e 1 **critério imunitário (item 2.2)**;

**OU**

2. Biópsia renal compatível com nefrite lúpica + FAN ou anticorpos anti-dsDNA **(item 2.3)**.

**Item 2.1. Critérios Clínicos:**

- Lúpus cutâneo agudo;**
- Lúpus cutâneo crônico;**
- Alopecia não cicatricial;**
- Úlceras orais ou nasais;**
- Alterações articulares:** sinovite em duas ou mais articulações, com edema ou derrame articular ou artralgia em duas ou mais articulações e rigidez matinal maior que 30 minutos;
- Serosites;**
- Alterações renais:** relação entre proteína e creatinina urinárias (ou proteinúria de 24 horas) representando mais de 500 mg de proteínas nas 24 horas ou presença de cilindros hemáticos. - **Anexar exames comprobatórios;**
- Alterações neurológicas;**
- Anemia hemolítica - Anexar exames comprobatórios;**
- Leucopenia ou linfopenia:** leucócitos  $<4.000/mm^3$  ou linfopenia  $<1.000/mm^3$  - **Anexar exames comprobatórios;**
- Trombocitopenia:** plaquetas  $<100.000/mm^3$ - **Anexar exames comprobatórios.**

**Item 2.2. Critérios Imunitário:**

- Fator Antinuclear (FAN)** acima do valor de referência - **Anexar exames comprobatórios;**
- Anti-DNA nativo** acima do valor de referência - **Anexar exames comprobatórios;**
- Anti-Sm positivo - Anexar exames comprobatórios;**
- Antifosfolípideo positivos:** anticoagulante lúpico; OU VDRL falso-positivo; OU anticardiolipinas (IgA, IgG ou IgM) em títulos moderados ou altos, OU anti-beta 2-glicoproteína 1 (IgA, IgG ou IgM); - **Anexar exames comprobatórios;**
- Complementos** abaixo do limite inferior do valor de referência: frações C3, C4 ou CH50 - **Anexar exames comprobatórios;**
- Coombs direto positivo** (na ausência de anemia hemolítica) - **Anexar exames comprobatórios.**

**Item 2.3:**

- Biópsia renal compatível com nefrite lúpica - Anexar FAN ou anticorpos anti-dsDNA.**

**Item 3. Critérios Eular/ACR 2019**

O paciente pode ser classificado como com LES se tiver pontuação  $\geq 10$ , sendo que, em cada domínio, deve ser utilizada a maior pontuação. Ainda, é condição necessária a positividade de FAN  $\geq 1:80$ .

<b>Domínio Constitucional</b> <input type="checkbox"/> Febre (2 pontos)	<b>Domínio hematológico</b> <input type="checkbox"/> Leucopenia (3 pontos) <input type="checkbox"/> Plaquetopenia (4 pontos) <input type="checkbox"/> Hemólise autoimune (4 pontos)
<b>Domínio Cutâneo</b> <input type="checkbox"/> Alopecia não cicatricial (2) <input type="checkbox"/> Úlceras orais (2) <input type="checkbox"/> Lúpus cutâneo subagudo ou Lúpus Eritematoso Discóide (4) <input type="checkbox"/> Lúpus cutâneo agudo (6 pontos)	<b>Domínio renal</b> <input type="checkbox"/> Proteinúria $\geq 0,5$ g/24 horas (4 pontos) <input type="checkbox"/> Biópsia renal classe II ou nefrite lúpica classe V (8 pontos) <input type="checkbox"/> Biópsia renal classe III ou nefrite lúpica classe IV (10 pontos)
<b>Domínio articular</b> <input type="checkbox"/> Sinovite ou dor à palpação $\geq 2$ articulações e rigidez matinal $\geq 30$ minutos (6 pontos)	<b>Domínio dos anticorpos antifosfolipídicos (Apresentar o exame quando o item for assinalado)</b> <input type="checkbox"/> aCL (IgG $> 400$ PL ou anti-B2GPI IgG $> 40$ ou LAC+ (2 pontos)
<b>Domínio neurológico</b> <input type="checkbox"/> Delírio (2 pontos) <input type="checkbox"/> Psicose (3 pontos) <input type="checkbox"/> Convulsão (5 pontos)	<b>Domínio complemento (Apresentar o exame quando o item for assinalado)</b> <input type="checkbox"/> C3 baixo ou C4 baixo 3 (3 pontos) <input type="checkbox"/> C3 e C4 baixos (4 pontos)
<b>Domínio serosas</b> <input type="checkbox"/> Derrame pleural ou pericárdico (5 pontos) <input type="checkbox"/> Pericardite aguda (6 pontos)	<b>Domínio dos anticorpos altamente específicos (Apresentar o exame quando o item for assinalado)</b> <input type="checkbox"/> Anti-dsDNA (6 pontos) <input type="checkbox"/> Anti-Smith (6 pontos)
<input type="checkbox"/> Paciente apresenta fator antinuclear (FAN) $\geq 1:80$ (condição necessária - Apresentar o exame)	

**DECLARAÇÃO MÉDICA SOBRE A POSITIVIDADE OU NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE DE MANTOUX (PPD) E IGRA**

**(para os medicamentos: Azatioprina, Metotrexato, Ciclofosfamida, Micofenolato de Mofetila e Ciclosporina)**

( ) a (o) paciente está em tratamento (há pelo menos trinta dias) para tuberculose latente ou já o completou a quimioprofilaxia para Tuberculose, devido à apresentação de exame positivo de PPD ou IGRA (deve ser anexada ao processo).

( ) a (o) paciente não apresenta manifestações clínicas e radiológicas características de Tuberculose. Considero em comum acordo com o paciente, que está ciente dos riscos, ser possível iniciar o tratamento com medicamentos biológicos ou inibidores de via de sinalização intracelular sem o resultado do exame de PPD ou IGRA (devido à impossibilidade de realização dos exames na rede pública de saúde) e sem a realização de tratamento para tuberculose latente.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo médico (a)

\_\_\_\_\_  
Data