

ESTRATÉGIAS PARA ATENUAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA		
Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 11 – 16/09/2024		
Medicamento	Dapagliflozina	
CID 10	N18.2; N18.3; N18.4 e N18.5	
Apresentação	10 mg (comprimido)	
Inclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Filtração Glomerular entre 25 e 75 mL/min/1,73m² e; • Uso de inibidores da ECA ou BRA e; • Diabetes e/ou com RAC maior que 300 mg/g (não diabéticos); • Idade mínima de 18 anos. 	
Anexos Obrigatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Formulário Médico devidamente preenchido; • Dosagem de creatinina sérica ou taxa de filtração glomerular; • Para pacientes não diabéticos: RAC urinária; • Beta-HCG para mulheres < 55 anos (ou declaração médica de que a paciente está na menopausa ou foi submetida a histerectomia ou laqueadura). 	
Administração	10 mg uma vez ao dia.	
Quantidade Máxima Mensal	31 comprimidos.	
Exclusão	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes que apresentarem toxicidade (intolerância, hipersensibilidade ou outro evento adverso) ou contraindicações ao uso do respectivo medicamento ou procedimento preconizado neste Protocolo. - Pacientes em terapia renal substitutiva ou transplantados. 	
Tempo de Tratamento	O tratamento deve ser interrompido com o início da terapia renal substitutiva ou transplante.	
Validade dos Exames	<ul style="list-style-type: none"> - Creatinina sérica ou taxa de filtração glomerular e RAC urinária: 6 meses. - Beta-HCG para mulheres < 55 anos: 30 dias. 	
Renovação	LME + receita médica.	
Especialidade Médica	Novas Solicitações e Adequações	Médico assistente da atenção primária ou Nefrologista.
	Renovações Sem Alterações	Médico assistente da atenção primária ou Nefrologista.
CID-10: N18.2 - Doença Renal Crônica estágio 2. N18.3 - Doença Renal Crônica estágio 3. N18.4 - Doença Renal Crônica estágio 4. N18.5 - Doença Renal Crônica estágio 5.		