



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE SANTA CATARINA – IPQ-SC

LORAZEPAM 2MG, COMPRIMIDO – INSTRUÇÕES DE USO

O uso do Lorazepam 2mg é restrito aos pacientes em Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) nível II com hepatopatia grave, de acordo com uma das seguintes condições:

- Pacientes em SAA nível II, avaliada pela CIWA-Ar, e história de hepatopatia grave, referida pelo paciente e/ou familiar, no momento da internação¹
- Pacientes em SAA nível II, avaliada pela CIWA-Ar, com sinais clínicos e queixas que sugiram hepatopatia grave no momento da avaliação²

¹ A suspeita de hepatopatia grave deve ser confirmada durante a internação, através de parecer clínico. Em caso de não ter o diagnóstico confirmado, substituir o tratamento por Diazepam ou Clordiazepóxido.

² Os sinais clínicos e queixas podem incluir ascite, icterícia, colúria, “aranhas vasculares” na pele, hepatomegalia, ascite.

Ver fluxograma – Anexo II.

Deve ser administrado, no máximo, 4mg/dia VO.

ANEXO I

Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised (CIWA-Ar)

Nome: _____ Data: _____
Pulso ou FC: _____ PA: _____ Hora: _____

1. Você sente um mal estar no estômago (enjôo)? Você tem vomitado?

0	Não
1	Náusea leve e sem vômito
4	Náusea recorrente com ânsia de vômito
7	Náusea constante, ânsia de vômito e vômito

2. Tremor com os braços estendidos e os dedos separados.

0	Não
1	Não visível, mas sente
4	Moderado, com os braços estendidos
7	Severo, mesmo com os braços estendidos

3. Sudorese:

0	Não
4	Facial
7	Profusa

4. Tem sentido coceiras, sensação de insetos andando no corpo, formigamentos, pinicações? Código da questão 8

5. Você tem ouvido sons a sua volta? Algo perturbador, sem detectar nada por perto? Código da questão 8

6. As luzes têm parecido muito brilhantes? De cores diferentes? Incomodam os olhos? Você tem visto algo que tem lhe perturbado? Você tem visto coisas que não estão presentes?

0	Não	4	Alucinações moderadas
1	Muito leve	5	Alucinações graves

7. Você se sente nervoso (a)? (observação)

0	Não	6	Extremamente graves
1	Muito leve	7	Continua
4	Leve		
7	Ansiedade grave, um estado de pânico, semelhante a um episódio psicótico agudo?		

8. Você sente algo na cabeça? Tontura, dor, apagamento?

0	Não	4	Moderado / grave
1	Muito leve	5	Grave
2	Leve	6	Muito grave
3	Moderado	7	Extremamente grave

9. Agitação: (observação)

0	Normal
1	Um pouco mais que a atividade normal
4	Moderadamente
7	Constante

10. Que dia é hoje? Onde você está? Quem sou eu? (observação)


0	Orientado
1	Incerto sobre a data, não responde seguramente
2	Desorientado com a data, mas não mais do que 2 dias
3	Desorientado com a data, com mais de 2 dias
4	Desorientado com o lugar e pessoa

Escore _____

Critérios diagnósticos: 0-9 SAA leve; 10-18 SAA moderada; > 18 SAA grave (nível II)

ANEXO II

LORAZEPAM 2MG – PROTOCOLO DE USO PARA PACIENTES EM SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA AGUDA (SAA) EM NÍVEL II, COM HEPATOPATIA GRAVE



* Os sinais clínicos e queixas podem incluir ascite, icterícia, colúria, “aranhas vasculares” na pele, hepatomegalia, ascite.