


ACROMEGALIA			
Portaria Conjunta SAS/MS nº 02 – 07/01/2019			
Medicamento	OCTREOTIDA	LANREOTIDA	CABERGOLINA
CID 10	E22.0		
Apresentação	10, 20 e 30mg de octreotida LAR (ampola) e 0,1mg/mL de octreotida injetável (ampola).	60, 90 e 120 mg (seringa preenchida).	0,5 mg (comprimido).
Inclusão	<p>Pacientes com diagnóstico de acromegalia confirmado por manifestações clínicas e comprovação laboratorial de excesso hormonal (elevação de IGF-1 e de GH) e por exames de imagem da hipófise (RM ou TC).</p> <p>Tratamento Primário: contraindicação ao tratamento cirúrgico e não apresentar sintomas compressivos secundários ao tumor.</p> <p>Tratamento Secundário: pacientes que após 3 a 6 meses do procedimento cirúrgico, não apresentarem critérios de controle da doença e aqueles que foram submetidos à radioterapia, mas ainda sem controle da doença.</p>		
Anexos Obrigatórios	<p>Relato médico com evolução clínica, sinais e sintomas do paciente, indicando se o tratamento é primário ou secundário.</p> <p>Exames: GH após sobrecarga de glicose; IGF-1, exame de imagem (RM ou TC); glicemia de jejum e TSH (se elevado anexar T4 Livre).</p>		
			Relato do uso prévio e tempo de tratamento com Octreotida ou Lanreotida.
Administração	<p>Octreotida: Uma injeção de 100 µg SC.</p> <p>Octreotida LAR: Iniciar com 20 mg, a cada 28 dias, aumentando até o máximo de 40mg a cada 28 dias.</p>	Iniciar com 90 mg, 1x/mês, podendo ser aumentada até 120 mg, 1x/mês (dose máxima).	Iniciar com 1 mg/semana por VO, podendo ser aumentada até 3,5 mg/semana.
Prescrição Máxima Mensal	8 amp (10mg), 4 amp (20mg), 2 amp (30mg) ou 1 amp (0,1mg/mL).	1 ser preenchida.	35 comprimidos.
Monitoramento	<p>- Dosagens de IGF-1 e de GH a cada 3 meses no primeiro ano e, após, anualmente em pacientes controlados. Doença não controlada, a cada 3 meses no primeiro ano, após esse período, dependerá da adição de novos tratamentos e da resposta a eles.</p> <p>- RM a cada 6 a 12 meses depois da cirurgia para acompanhamento. Após o primeiro exame, a periodicidade dependerá da resposta do paciente ao tratamento.</p>		
Exclusão	Hipersensibilidade ou intolerância ao(s) medicamento(s).		
Tempo de Tratamento	Indeterminado.		
Associações Permitidas	Não Octreotida + Lanreotida.		

Validade dos Exames	- GH após sobrecarga de glicose; IGF-1, glicemia de jejum, TSH e T4 Livre: 3 meses; - Exame de imagem (RM ou TC): 12 meses.	
Especialidade Médica	Novas Solicitações e Adequações	Neurocirurgião, Endocrinologista e Neuroendocrinologista.
	Renovações Sem Alterações	Não especificada a especialidade médica necessária.
SINAIS CLÍNICOS: Desfiguração cosmética, alterações articulares, neuropatia, cardiopatia, macrognatia, crescimento exagerado de mãos e pés, hipertrofia dos tecidos moles, cefaléia, bócio, osteoartrite, fadiga, distúrbios visuais, polipose colônica, macroglossia, apnéia do sono, desordens reprodutivas e cardiovasculares.		
CID-10: E22.0 Acromegalia e gigantismo hipofisário		



DIAF
Diretoria de Assistência
Farmacêutica