



**CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA  
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR  
PORTARIA CONJUNTA Nº 8 - 30/07/2019**



Declaro para os devidos fins de solicitação de medicamentos para tratamento da Dislipidemia, que o(a) paciente \_\_\_\_\_ satisfaz os seguintes critérios:

<b>CRITÉRIOS</b>	<b>PONTOS</b>
<b>História familiar</b>	
Familiar de primeiro grau com doença aterosclerótica prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos) Familiar de primeiro grau com LDL-C acima do percentil 95	1
Familiar de primeiro grau com xantoma tendinoso e/ou arco córneo Criança (menores de 18 anos) com LDL-C acima do percentil 95	2
<b>História clínica</b>	
Paciente com doença arterial coronariana prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	2
Paciente com doença arterial cerebral ou periférica prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	1
<b>Exame físico</b>	
Xantoma tendinoso	6
Arco córneo antes dos 45 anos	4
<b>Exames laboratoriais</b>	
LDL-C maiores ou iguais a 330 mg/dL	8
LDL-C entre 250 e 329 mg/dL	5
LDL-C entre 190 e 249 mg/dL	3
LDL-C entre 155 e 189 mg/dL	1
Mutação genética presente	8
<b>TOTAL DE PONTOS</b>	

<b>Diagnóstico de hipercolesterolemia familiar é:</b>	
Definitivo com	Mais de 8 pontos
Provável com	6-8 pontos
Possível com	3-5 pontos

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo médico (a)

\_\_\_\_\_  
Data