


Atualização do PCDT de Puberdade Precoce Central com a inclusão do:

acetato de leuprorrelina de 45mg¹

Principais
diferenciais:

A CADA
6
MESES

Aplicação
semestral
(a cada 6 meses)²




Injeção
Subcutânea²



IMPORTANTE


O acetato de leuprorrelina 45mg é um medicamento termolábil e precisa ser mantido sob refrigeração.²

2° a 8°C



**Necessário
refrigeração entre
2°C e 8°C²**

Dispensação
Térmica | Isopor



Para dispensação, é obrigatório que o paciente **tenha uma caixa de isopor ou térmica** contendo em seu interior **placa de gelo espuma ou em gel**, cobrindo o seu fundo.³

Programa
por
Você



Ligação Gratuita

0800 772 0075

Atendimento de 2ª a 6ª feira das 08h às 18h



WhatsApp

(11) 94462-3570



programaporvocê
.com.br

Programa de Suporte
para os Pacientes com

**APLICAÇÃO
GRATUITA**

A eficácia do acetato de leuprorrelina 45mg está relacionada diretamente com o preparo e administração correta do produto.²



Armazenamento refrigerado²

O medicamento deve ser mantido à temperatura de 2 a 8°C.



Temperatura ambiente²

Permitir que o medicamento atinja a temperatura ambiente antes de manipular. Para isso, retirar da geladeira 30 minutos antes de realizar a manipulação.



Manipulação²

Seguir o passo a passo da manipulação de acordo com o recomendado.



Administração²

Após a reconstrução do medicamento, ele deve ser aplicado em até 30 minutos.



Ângulo de 90°²

O acetato de leuprorrelina deve ser aplicado em um ângulo de 90°.



Aplicação 2x ao ano²


O acetato de leuprorrelina é administrado a cada 24 semanas.

Modo de Preparo²

PASSO 1

Comece com a seringa B


Puxe o êmbolo curto de ponta azul junto com o batoque cinza anexo da seringa B e descarte.



PASSO 2

Introduza o êmbolo longo branco


Introduza delicadamente o êmbolo longo branco da embalagem da **seringa A** no batoque primário cinza da **seringa B** girando-o para posicioná-lo.



PASSO 3

Remova as tampas

Desrosqueie a tampa transparente da **seringa A** e remova a tampa cinza de borracha da **seringa B**, depois descarte as duas tampas.




PASSO 4

Conecte as seringas

Conecte as duas seringas empurrando a **seringa A** dentro da **seringa B**, girando-as até que estejam firmemente conectadas.


Cuidado para não apertar excessivamente.



PASSO 5

Misture o conteúdo


Injete o conteúdo da **seringa A** na **seringa B** (com acetato de leuprorrelina em pó).



PASSO 6

Remova a seringa

1. Segure as seringas verticalmente com a **seringa B** na parte de baixo. As seringas devem permanecer firmemente acopladas.
2. Transfira todo o produto misturado para a **seringa B**.
3. Desconecte a **seringa A** pressionando para baixo o seu êmbolo.
4. Permanecerão pequenas bolhas de ar na formulação (isso é aceitável).



PASSO 7

Conecte a agulha esteril fornecida

1. Segure a **seringa B** na posição vertical.
2. Abra a embalagem de agulha esteril.
3. Segurando a agulha em sua capa protetora, gire a **seringa** em sentido horário, empurrando a agulha 3/4 de um giro até que a agulha esteja totalmente acoplada.
4. Remova a capa protetora da agulha.



A partir deste momento, **o produto deve ser aplicado em até 30 minutos.²**

Recomenda-se a aplicação **somente por profissionais treinados e habilitados pelo fabricante**. Solicite ao paciente que **entre em contato com o Programa Por Você**, o programa de suporte ao paciente do fabricante, para **orientação sobre os locais credenciados para aplicação do acetato de leuprorrelina 45mg**.