SÍNDROMES CORONARIAS AGUDAS (SCA)	
Portaria SAS/MS nº 2.994 - 13/12/2011	
Medicamento	CLOPIDOGREL
CID 10	I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8 e I24.9
Apresentação	75mg (comprimido)
Inclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST); <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSSST): <ul style="list-style-type: none"> - Não submetido a intervenção coronária percutânea (com ou sem terapia fibrinolítica) OU; - Com implante de stent (convencional ou farmacológico). <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacientes em uso de AAS ou com hipersensibilidade ou intolerância gastrointestinal ao AAS.
Anexos Obrigatórios	Formulário Médico para SCA.
Administração	<ul style="list-style-type: none"> • IAMSSST – 75mg/dia; • IAMCSSST – 75mg/dia.
Prescrição Máxima Mensal	31 cp
Monitoramento	A critério médico.
Exclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Hipersensibilidade ou intolerância ao medicamento; E/OU • Úlcera péptica; E/OU • Hemorragia intracraniana.
Tempo de Tratamento	<ul style="list-style-type: none"> • IAMSSST: <ul style="list-style-type: none"> - 75mg/dia por 9 meses; - Caso o paciente apresente risco de sangramento aumentado, o clopidogrel deve ser mantido por no mínimo 4 semanas. • IAMCSSST: <ul style="list-style-type: none"> - Pacientes não submetidos à ICP (com ou sem terapia fibrinolítica) manter clopidogrel 75mg por no mínimo 4 semanas, podendo se estender por 9 meses; - Pacientes com implante de stent (convencional ou farmacológico), manter clopidogrel 75mg por 9 meses. • Em casos de hipersensibilidade ou intolerância gastrointestinal ao AAS, deve ser utilizado clopidogrel 75mg/dia por tempo indeterminado. • Diante da necessidade de continuação do tratamento, o estabelecimento hospitalar deverá entregar no dia da alta, 30 (trinta) comprimidos ao paciente até que seja adquirido pelo Componente Especial da Assistência Farmacêutica (CEAF).
Especialidade Médica	Sem especialidade médica necessária.
Observação: Não foi disponibilizado pelo MS o Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.	

CID-10:

- I20.0** Angina instável
- I20.1** Angina pectoris com espasmo documentado
- I21.0** Infarto agudo do miocárdio
- I21.2** Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações
- I21.3** Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada
- I21.4** Infarto agudo subendocárdico do miocárdio
- I21.9** Infarto agudo do miocárdio não especificado
- I22.0** Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior
- I22.1** Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior
- I22.8** Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações
- I22.9** Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada
- I23.0** Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.1** Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.2** Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.3** Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.4** Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.5** Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.6** Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
- I23.8** Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio
- I24.0** Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio
- I24.8** Outras formas de doença isquêmica aguda do coração
- I24.9** Doença isquêmica aguda do coração não especificada

DIAF
Diretoria de Assistência
Farmacêutica