




SEJA BEM-VINDO À 24ª


CEMPI NEWS

Endoftalmite.

ENDOFTALMITE SIGNIFICA, GERICAMENTE, UMA INFECÇÃO DENTRO DO OLHO. A ENDOFTALMITE INFECCIOSA PÓS-CIRÚRGICA É MAIS COMUMENTE ENCONTRADA, MAS EXISTEM OUTROS TIPOS DE ENDOFTALMITE, TAIS COMO A ENDOFTALMITE ESTÉRIL, A ENDÓGENA, FÚNGICA E A CRÔNICA.



A ENDOFTALMITE INFECCIOSA BACTERIANA É A COMPLICAÇÃO MAIS TEMIDA APÓS UMA CIRURGIA DE CATARATA. É O TIPO MAIS COMUM, E MAIS PERIGOSO, DE ENDOFTALMITE, PODENDO LEVAR A PERDA OU REDUÇÃO DA ACUIDADE VISUAL E, EM ALGUNS CASOS MAIS TRAUMÁTICOS, NA PERDA DO OLHO.



A vigilância dos casos de endoftalmite poderá ser realizada de forma passiva, ativa ou com a combinação destas duas formas. É altamente recomendada a incorporação de algum método de busca ativa de casos para aumentar a confiabilidade dos indicadores obtidos.

A **busca passiva** de casos pode ser realizada por meio de **notificação pelos membros que compõem o corpo de profissionais da instituição**, sobretudo a equipe médica e de enfermagem, já a **busca ativa** deve ser com **coleta sistemática e contínua dos dados referentes às informações básicas** sobre cada procedimento realizado e feito contato com os pacientes por busca fonada, WhatsApp ou por verificação no ambulatório de egressos de todos os que fizeram Facectomia (cirurgia de catarata) ou injeção intravítreo de medicamento.

Os serviços de saúde que realizam procedimentos cirúrgicos oftalmológicos de pacientes provenientes de outras instituições ou consultório médico particular devem fazer a busca ativa por meio de contato telefônico com os pacientes operados na instituição, inicialmente na primeira semana e após no mínimo 30 e no máximo 90 dias (quando houver algum implante) da data da cirurgia para identificar, por meio do relato do paciente, se é um caso suspeito de endoftalmite.

O caso suspeito será aquele em que houver resposta positiva a uma destas perguntas:

- ✓ O Sr.(a) teve infecção no olho operado?
- ✓ O Sr.(a) teve que fazer alguma injeção dentro do olho operado depois da cirurgia?
- ✓ O Sr.(a) teve que fazer alguma outra cirurgia no olho operado depois da cirurgia?
- ✓ O Sr.(a) ficou com a visão pior depois da cirurgia?

Para descartar ou confirmar o caso suspeito, poderá ser enviado ao médico ou serviço externo responsável pelo paciente uma solicitação formal de informações sobre a evolução da cirurgia do paciente.

FONTE: CVE-SÃO PAULO

EM CASO DE SURTOS INFECCIOSOS EM QUALQUER SERVIÇO OFTALMOLÓGICO, INDEPENDENTEMENTE DO PROCEDIMENTO, DEVEM SER NOTIFICADOS NO FORMULÁRIO DE SURTOS DA ANVISA: [HTTPS://PESQUISA.ANVISA.GOV.BR/INDEX.PHP/742771?LANG=PT-BR](https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/742771?lang=pt-br).

[NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 05/2025 ORIENTAÇÕES PARA A VIGILÂNCIA DAS ENDOFTALMITES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS INVASIVOS – ANO: 2025](#)


LINK PARA NOTIFICAÇÃO DE ENDOFTALMITES: CLIQUE AQUI!

CÁLCULO DOS INDICADORES

INDICADOR	NUMERADOR (a ser notificado pelo serviço de saúde)**	DENOMINADOR (a ser notificado pelo serviço de saúde)**
Taxa de Endoftalmites relacionadas a Facectomia (cirurgia de catarata)	Número de casos de endoftalmites relacionadas a facectomia (cirurgia de catarata) no mês de vigilância Número de casos de endoftalmites relacionadas a facectomia (cirurgia de catarata) com confirmação laboratorial	Número de cirurgias de facectomia (cirurgia de catarata) realizadas no mês de vigilância
Taxa de Endoftalmites relacionadas a Injeção intravítrea de medicamentos* *Observação: exceto injeção intravítrea para aplicação de antimicrobianos por suspeita de endoftalmite.	Número de casos de endoftalmite relacionadas a injeção intravítrea de medicamentos Número de casos de endoftalmite relacionadas a injeção intravítrea de medicamentos com confirmação laboratorial	Número de injeção intravítrea de medicamentos realizadas no mês de vigilância

AS FALHAS NO CONTROLE DE INFECÇÃO E NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS FORAM APONTADAS COMO AS PRINCIPAIS CAUSAS DOS SURTOS DE ENDOFTALMITE. SENDO ASSIM É DE SUMA IMPORTÂNCIA A ADEÇÃO ÀS REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS, ESPECIALMENTE EM CONTEXTOS DE GRANDES DEMANDAS (MUTIRÕES), ONDE A DEMANDA ELEVADA NÃO PODE JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS.

ABIH/SBI 2024



A CEMPI DIVULGARÁ UMA NOTA TÉCNICA COM TODAS AS MEDIDAS IMPORTANTES PARA PREVENÇÃO DE ENDOFTALMITE, EM BREVE! FIQUE ATENTO...

QUER SABER MAIS?

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ENDOFTALMITES E DE SÍNDROME TÓXICA DO SEGMENTO ANTERIOR RELACIONADAS A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS INVASIVOS - CADERNO 9

NOTA CONJUNTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS EM CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR (ABIH) E A SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA (SBI) SOBRE SURTOS DE ENDOFTALMITE EM SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL.

REUNIÃO DA CEMPI 30/04 SERÁ COM DRA DENISE BRANDÃO DO CVE - SÃO PAULO, SOBRE ENDOFTALMITE. APROVEITE!

WEBCONFERÊNCIA - DEBATENDO COM A APECIH - 26 DE MARÇO DE 2025

ATÉ BREVE!

CEMPI@SAUDE.SC.GOV.BR